

tégminas, y por las tibias posteriores mas largas y su tarso basilar oblongo y mas largo.

La frente es muy particular, representándose como una placa transversal, algo convexa, carenada en el medio y en sus bordes y separada en los lados por un espacio subfrontal ó subtemporal, exteriormente carenado; en este último, entre el ojo y la carena marginal de la placa y entre esta y el clipeo, se encuentran los nódulos oceliformes, parecidos á los de las partes laterales del pronoto y mesonoto.

143. *Plagiopsis Distanti* n. sp.

♂ et ♀: Supra sordide testacei, subtus fusci, ad partem luteo-variegati; capite utrimque et postice, pronoto mesonoto in partibus lateralibus, apice lineaque media, nec non venis tegminum ex parte luteis, ex parte fuscescentibus; fronte nigra, marginibus lineaque transversa ante medium sita flavidis ornata, vel flavida, fasciis duabus, una basali, altera media, nigricantibus praedita; dorso abdominis nigro, utrimque late albido-vittato; tegminibus subhyalinis, venis apicem versus infuscatis; pedibus fuscescentibus, geniculis marginibusque luteis. — Long. corp. 2,5-3,5, cum tegm. 3,7-4,5; lat. meson. 1,2-1,4 mm.

Patria: Provincia Bonaerensis.

De esta singular especie posee el Museo Público un ♂, y yo una ♀ y una pseudo-imágen; todos los ejemplares provienen de Chacabuco, y han sido descubiertos por el Sr. D. FÉLIX LYNCH.

La pseudo-imágen es de un testáceo claro, provista de dos fajas congitudinales amarillas en cada tégmina rudimentaria y de una en cada lado del dorso abdominal; del mismo tinte amarillo ó fulvo son las márgenes de la cabeza, los bordes laterales del pronoto y mesonoto y la carena media de la frente, cuya mitad superior es negra, adornada de la línea transversal blanquizca bien marcada. Las partes laterales del esternon son negruzcas y el vientre es fuscescente, con la base y el ápice testáceos.

(Continuad).

ADDENDA ET EMENDANDA

AD

HEMIPTERA ARGENTINA.

AUCTORE C. BERG.

(Continuatio)

Subf. DELPHACINA. (*)

Gen. BERGIA SCOTT.

SCOTT, Ent. Monthl. Mag. XVIII, p. 155 (1882).

REUT., Zool. Jahresber. für 1881. II, p. 283
(1882).

144 (275). **Bergia nimbata** (BERG) SCOTT.

Liburnia nimbata BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 191. 275 et Hem.
Arg. p. 226. 275 (1879).

Bergia nimbata SCOTT, Ent. Monthl. Mag. XVIII, p. 155 (1881).

Un ejemplar recogido posteriormente por el Sr. GÜNTHER en Buenos Aires, es mucho mas oscuro que el típico, pero por lo demas correspondiente á los caracteres generales y esenciales.

IDIOSYSTATUS n. gen.

Caput modice productum; vertice aequaliter
triangulari, postice perparum exciso, marginibus

(*) Al enumerar los representantes de esta subfamilia en mi *Hemiptera Argentina*, he colocado tres especies en géneros á que no pertenecen, por falta de las obras modernas de FIEBER y de material de comparacion. Ahora, en poder de las primeras y ademas por haber examinado solícitamente el Sr. D. J. SCOTT todas mis especies típicas, vuelvo á disponerlas de nuevo.

lateralibus valde elevatis, carinā media antice abbreviata; fronte obovali, fere duplo longiore quam latiore, carinis duabus cum marginibus carinatis parallelis instructa; clypei medio marginibusque carinatis. Oculi mediocres, infra sat profunde sinuati. Ocelli parvi. Antennae breviusculae, articulo secundo primo duplo fere longiore. Pronotum trapezoidale, integre tricarinarum, postice late triangulariter sinuatum. Mesonotum quinquecarinarum, carinis laterali et intermedia postice arcuatim conjunctis, illa ad marginem posticam mesonoti extensa, apice triangulariter producta. Tegmina subhyalina, venis granulatis et setigeris, tantum sectore primo in medio tegminis bifurcata, cellulis apicalibus sex vel septem, venula tertia apicali bifurcata. Pedes mediocres; tibiis posticis ad latera trispinosi; calcari parvo; tarsorum posticorum articulo basali secundo duplo fere longiore.

Se coloca entre *Bergia* SCOTT é *Idiosemus* BERG, teniendo cierta semejanza con los dos. Se distingue del primer género, por el cuerpo angosto, por el vértice mas prolongado y triangular, por la frente mucho mas larga y por sus carenas íntegras, por la carena media del clipeo, por las antenas mas cortas y las carenas mas salientes del pronoto y mesonoto y las laterales posteriormente unidas en este último. Difiere del *Idiosemus*, por el cuerpo mas ancho, por la cabeza muy poco prolongada, por el vértice en forma de triángulo equilátero, por la frente obovoidal, por los ojos inferiormente mas escotados, las antenas mas gruesas y ménos largas, y por las cinco carenas del mesonoto. La estructura de las tégminas es casi como en este último género.

145. *Idiosystatus acutiusculus* (? SPIN.) BERG.

♀: Sordide testacea, vertice inter carinas, maculis discoidalibus oblongis flavidis exceptis, fronte, fascia obsoleta et arcuata media flavida, carinis apiceque exceptis, clypeo inter carinas, maculis discoidalibus oblongis apiceque exceptis, pronoto

basi, ad carenas et punctis duobus medio-sublateralibus, mesonoto, carinis apiceque exceptis, granulis tegminum, dorso abdominis ad partem, basi articularum antennarum, maculis pectoris coarumque, basi ventris, striolis femorum tibiarumque, nec non tarsis ad partem, fuscis vel nigris.— Long. corp. 3,5, cum tegm. 4-4,2; lat. meson. 1 mm.

Patria : Patagonia (Rio Santa Cruz).

? *Delphax acutiuscula* SPIN. in GAY, Hist. de Chile. Zool. VII, p. 258. 1 (1852).

Es muy probable que la especie que tengo á la vista, es la *Delphax acutiuscula* SPIN.; en contradiccion están solo el vértice, que en la especie de SPINOLA es, segun la descripción, si bien la entendamos, dos veces mas largo que ancho en su base, y el clipeo (caperuza de este autor), no lleva una carena media. Si la especie chilena es otra, pertenecerá tambien por los caracteres indicados y otros, á un género diferente, de manera que el nombre específico adoptado por mí, no ha de dar lugar á confusiones.

Los dos ejemplares que conserva el Museo Público, fueron recogidos por mí en las barrancas altas del Rio Santa Cruz, el 9 de Octubre de 1874.

IDIOSEMUS n. gen.

Corpus longiusculum, antrorsum retrorsumque attenuatum. Caput ante oculos longe triangulariter productum; vertice planiusculo, latitudine basis plus quam duplo longiore, sensim acuminato, marginibus alte carinatis, medio carina percurrente instructo, margine postico in medio angustissime sinuato; fronte lanceolata, interdum convexiuscula, medio haud carinata, apice truncata, carinis lateralibus et marginibus sat elevatis; clypeo medio marginibusque carinato. Antennae mediocres, teretes, articulo secundo primo quadruplo longiore. Oculi infra perparum sinuati. Pronotum et mesonotum planiuscula, hoc quadricarinatum, carinis

mediis postice paullo abbreviatis, apice obtuso sat longe producto, illud carinis tribus percurrentibus instructum, margine postico late triangulariter sinuato et medio ut in vertice angustissime exciso. Tegmina oblonga, diaphana, apice haud ampliata, inervatio fere ut in *Bergia* SCOTT: vena radialli prima (sector primus) tantum in medio tegminis bifurcata, et venula tertia apicali etiam solum bifurcata. Pedes breviusculi; tibiis posticis ad latera trispinosis, apice sexspinosi; tarsi tibia multo brevioribus.

Muy parecido al género *Tropidocephala* STÅL (*Nephropsia* A. COSTA), distinguiéndose del mismo principalmente por la falta de la carena media de la frente, por las cuatro carenas del mesonoto, por el segundo artículo de las antenas mas largo, por los ojos inferiormente ménos sinuados, por tener las tibias tres espinas laterales, por los tarsos posteriores mas cortos, por los dos nervios (segundo y tercer sector) de las tégminas no furcadas y por tener solo bifurcado el tercer nervio apical.

146 (273). **Idiosemus Xiphias** BERG.

† *Liburnia Xiphias* BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 170. 273 et Hem. Arg. p. 225. 273 (1879).

Nephropsia Xiphias SCOTT in litt.

Esta especie, la que me habia determinado STÅL como *Liburnia* y SCOTT como *Nephropsia*, queda ahora atribuida al nuevo género *Idiosemus*.

La he observado últimamente en muchos ejemplares en la Banda Oriental del Uruguay; el Museo Público la posee tambien del Rio Negro de Patagonia, donde la coleccioné en el mes de Diciembre de 1874.

La larva y la pseudo-imágen son de color amarillo testáceo, superiormente blanquizas, provistas de una faja longitudinal lateral, que se extiende desde el ápice de la prolongacion cefálica hasta el segmento anal del abdomen, pasando por el medio de las vainas de las tégminas. El pronoto, mesonoto y metanoto, llevan

cuatro carenas percurrentes, y se ve una carena de vez en cuando interrumpida en el dorso abdominal, guarnecida de una línea fusciscente en los dos lados. La frente es como en la imagen.

Vive en la *Baccharis coridifolia* DC.

Gen. MEGAMELUS FIEB.

Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XVI, p. 519.
tab. 8, fig. 2 (1866); Rev. et Mag. de Zool. Sér.
3. III, p. 369 et Cicad. d'Europ. I, p. 82 (1875).

147. *Megamelus scutellaris* n. sp.

♀: Testaceo-flavida, mesonoto utrimque et postice, hemelytrorum basi, apice clavi venulisque transversis ex parte, frontis fasciis basali obsoleta et subapicali lata, coxarum annulo medio, femorum apice obsolete, tibiaram anticarum intermediarumque annulis basali apicalique et posticarum basi, nec non tarsorum apice, brunneis vel dilute fuscis; dorso abdominis ventreeque sordide aurantiacis, hoc margine laterali obsolete fusco-maculato. — Long. corp. 3,5, cum tegm. 4,5; lat. meson. 4 mm.

Caput admodum productum; vertex antice alte carinatus, postice in angulum latissimum et brevissimum productus; fronte distincte tricarinata, apice subsinuata et ante marginem carina triangulari instructa; clypeo convexiusculo, carina media basi nonnihil abbreviata. Rostrum coxas intermedias superans, articulo apicali praecedente paullo brevior. Pronotum basi lateribusque obsolete infuscatum. Mesonotum utrimque valde infuscatum, carinis lateralibus et media in depressione obsoletis, apice late triangulari. Tegmina hyalina, infuscatione basali apicalique scutelli dilute brunneis, venulis transversis in medio tegminis et ejus angulo interno limbali parum fusciscentibus.

Patria: Corrientes.

Esta especie, recogida por mí en Corrientes á fines de Diciembre de 1876, es fácil de reconocer por la coloracion y los dibujos, que la distinguen bien de sus pocos congéneres europeos.

Gen. **STENOCRANUS** FIEB.

Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XVI, p. 519.
tab. 8, fig. 3 (1866); Rev. et Mag. de Zool. Sér.
3. III, p. 370 et Cicad. d'Europ. I, p. 83 (1875).

148 (269). **Stenocranus maculipes** (BERG) SCOTT.

† *Delphax maculipes* BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 187. 269 et
Hem. Arg. 223. 269 (1879).

Stenocranus maculipes SCOTT in litt.

No ha sido observada despues de su descripcion.

Gen. **EUIDES** FIEB.

Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XVI, p. 519.
tab. 8, fig. 7 (1866); Rev. et Mag. de Zool. Sér.
3. III, p. 373 et Cicad. d'Europ. I, p. 86 (1875).

149. **Euides fusco-vittata** SCOTT.

Euides fusco-vittata SCOTT, Ent. Monthl. Mag. XVIII, p. 155 (1881).

Patria: Provincia Bonaerensis.

El ejemplar típico, originario de Buenos Aires, se encuentra en mi coleccion, y aun otro, tambien ♀, que me ha sido enviado de Chacabuco por el Sr. LYNCH, y que es en todo mucho mas oscuro que el primero. principalmente en cuanto á la infuscacion de la parte terminal del clavo.

150. **Euides fucata** n. sp.

♂: Dilute piceus, ad partem, praesertim capite,
pronoto, mesonoto pedibusque, sordide testaceus;
tegminibus vitta lata oblique percurrente et altera

brevi antico-limbali fuscis ornatis; connexivo maculis parvis flavidis praedito. — Long. corp. 3,3, cum tegm. 5; lat. meson. 1,4 mm.

Caput perparum productum; vertice carinis obsoletis instructo; fronte medio impressa et ibidem carina media obsoleta, carinis marginalibus distinctis; clypeo ad basin medio obsolete carinato. Pronotum carinis albidis ornatum, postice levissime latissimeque triangulariter sinuatum. Mesonotum sat distincte tricarinatum, postice impressum et obtusiuscule productum. Tegmina ad partem vitrea, vittis fuscis insignissimis ornata, vitta longa in cellula media interiore pallidiore. Alae vitreae. Pedes sordide testacei, hic illic perparum infuscati.

Patria: Provincia Bonaerensis.

Poseo un solo individuo de esta especie, recogido en Chacabuco por el Sr. LYNCH, que es muy característica por las dos fajas longitudinales oscuras de las tégminas y por la frente algo deprimida en su parte media, con la carena allí desvanecida.

Gen. LIBURNIA STÅL.

FIEB., Rev. et Mag. de Zool. Sér. 3. III, p. 376 et Cicad. d'Europ. I, p. 89 (1875).

151 (271). **Liburnia Bergi** SCOTT.

Liburnia cognata BERG (non FIEB.), Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 188. 271 et Hem. Arg. p. 224. 271 (1879).

Liburnia Bergi SCOTT, Ent. Monthl. Mag. XVIII, p. 156 (1881).

A causa de una denominacion ya anteriormente empleada, ha sido cambiado el nombre por el Sr. SCOTT.

Anotacion. — Las demas especies del género *Liburnia*, enumeradas ó descritas por mí, á saber: *L. patruelis* STÅL, *L. univittata* BERG, *L. nigricula* BERG y *L. fusco-terminata* BERG, están genéricamente bien colocadas.

Subf. ISSINA BERG.

Issida (partim) STÅL, Hem. Afr. IV, p. 131 et 202 (1866).

FLIEB., Rev. et Mag. de Zool. Sér. 3, III, p. 362 et Cicad. d'Europ. I, p. 75 (1875).

Issina BERG, Anal. Soc. Cien. Arg. VIII, p. 209 et Hem. Arg. p. 228 (1879).

Gen. FALCIDIUS STÅL.

Hem. Afr. IV, p. 205 (1866).

152. *Falcidius lyra* (BURM.) n. sp.

♂ et ♀: Nigro-picei, nitidi, linea media capitis antice in fronte abbreviata sed postice per pronotum, mesonotum et suturam tegminum, hic atque adeo apicem versus multo latiore, continuata, altera media tegminis bisinuata, cum opposita figuram lyrae fingente, nec non costa tegminum, dorso abdominis in medio pedibusque ex parte, sordide flavis. — Long. corp. cum tegm. 4,5; lat. pron. 2 mm.

Caput valde declive; vertice laeviusculo, postice modice sinuato, antice subarcuato-carinato; fronte alutaceo-rugosa, marginibus infra oculos late rotundatis, apice sinuata; clypeo obtuso, linea media flavida obsoleta ornato. Pronotum medio obsolete carinatum, in margine postico medio vix obsoletissime sinuatum. Mesonotum utrimque leniter biimpressum et in impressione ante apicem perparum transverso-rugulosum. Tegmina alutacea, sutura clavi distinctissima, venis obsoletis. Alae rudimentariae. Pedes ex parte picei ex parte testacei, obscure marginati; tibiis apicem versus tarsisque pallidioribus, illis in dimidio terminali extus bi spinosis, horum articulo basali mediocre.

Patria: Republica Argentina (Entre Rios).

Issus lyra BURM., in Mus. Pub.

Los dos ejemplares que me sirven para la fundacion de esta especie muy característica por el dibujo, conserva el Museo Público, y han sido recogidos en la Concepcion del Uruguay por el Dr. D. ADOLFO DOERING.

En el Museo Real de Berlin se encuentran dos ejemplares de la misma especie, como coleccionados por REICH en Buenos Aires; provendrán probablemente de otra parte de la República Argentina, por no haber sido hallados por nosotros nunca en Buenos Aires.

Subf. FLATINA.

Gen. ORMENIS STÅL.

153 (279). *Ormenis cestri* BERG.

La larva y pseudo-imágen que viven en la *Acacia Farnesiana* WILLD., son de un verde muy claro y están provistas de una materia farinácea blanca y adornadas de dos pequeñas manchas negras en el dorso abdominal, cerca de su ápice. El vértice de la cabeza lleva una carena que se extiende sobre el pronoto y mesonoto, cambiando en un surco en los ejemplares que están próximos á la transformacion en la imágen.

Se hallan en el mes de Noviembre.

Fam. CERCOPIDAE

Subf. CERCOPINA

Gen. TOMASPIS AM. et SERV.

154 (288). *Tomaspis terrea* (GERM.).

† *Cercopis terrea* GERM., Mag. der Ent. IV, p. 46. 17 (1821).

† *Monecphora ? terrea* WALK., List of Hom. III, p. 685. 35 (1851).

* *Tomaspis argentina* BERG., Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 217, 288 et Hem. Arg. p. 236, 288 (1879)

La sinonimia queda establecida según el exámen de cuatro ejemplares provenientes de Montevideo, que se encuentran en el Museo Real de Berlín, y que deben haber sido comparados con los típicos del primer autor.

155. **Tomaspis tristis** (FABR.) STÅL.

Cercopis tristis FABR. Syst. Rhyng. p. 90. 11 (1803).

Tomaspis tristis STÅL, Hem. FABR. II, p. 13. 3 (1869).

STÅL, Cig. fig. 20 et 88 (1788).

De esta especie posee el Museo Real de Berlín cinco ejemplares provenientes de Montevideo, el Dr. SIGNORET tiene dos que ha recibido de GERMAR, el Museo Público de Buenos Aires conserva uno como originario de Buenos Aires, y yo he recibido uno muy defectuoso de Chacabuco (Provincia de Buenos Aires), enviado por el Sr. LYNCH.

Es muy variable: Tiene las manchas rojas ó naranjadas de mayor ó menor número é intensidad, bien separadas, algunas unidas y hasta formando fajas mas ó ménos irregulares. Los dos ejemplares de Berlín que tengo para mi exámen, poseen las manchas rojas y bordeadas de amarillo, los del clavo son desvanecidas. El ejemplar del Museo Público bonaerense tiene todas las manchas unidas entre sí formando una faja roja de ladrillo muy ancha que deja solo la base y la extremidad y en un tégmen algunas pocas líneas irregulares de color fusco.

La *Tomaspis integra* (WALK.) BERG, será probablemente una variedad de esta especie.

156. **Tomaspis platensis** n. sp.

♂ et ♀: Parum sericei, supra testaceo-lutei, vitta fusciscenti tegminum, limbum versus ampliata, ornati, subtus cum pedibus lurido-testacei, in disco ventris infuscata et ad marginem ventralem ex parte rubro-tincti.—Long. corp. 8-10, cum tegm. 11-13; lat. hum. 3-3,5 mm.

Caput antice rotundatum; vertice utrimque impresso, medio valde ante oculos sulco transverso instructo, medio longitudinaliter carinato; fronte

tumida, convexa, basi medio distincte carinata, utrimque transversim striolata. Pronotum antice foveolatum, postice obsolete scrobiculato-punctatum. Scutellum acuminatum, medio impressum. Tegmina punctulata, apice parum areolata, vitta media fuscescenti interdum obsoleta. Alae hyalinae, ad partem fuscescenti-venosae. Dorsum abdominis saepe rufum. Tarsi apice spinaeque parte terminali tibiarum posticarum fusci vel nigricantes.

Patria: Republicae Argentina et Uruguayensis.

De esta especie, que es fácil de reconocer por el diagnóstico dado, se hallan tres ejemplares en el Museo Real de Berlin, coleccionados por SELLOW en Montevideo, y dos en la colección mía, recogidos por el Sr. D. FÉLIX LYNCH en Chacabuco, en donde es muy común en diferentes plantas, en los meses de Diciembre y Enero.

(Continuará).