

ON SOME MIRIDÆ FROM FRENCH GUIANA.

by E. Bergroth.

Platytylellus Poppii n. sp.

Oblongus, opacus, dense sed brevissime et subtilissime puberulus, supra fusco-cinnamomeus, subtus testaceus, callis pronoti nigricantibus, antennis, rostro, pedibus ac lateribus apiceque ventris fuscis, ima basi articuli primi antennarum, vitta media retrorsum sensim dilatata ab apice pronoti usque ad apicem scutelli commissuraque clavi angustissime luteis, cuneo fuscotestaceo, margine ejus basali et externo dilutioribus, membrana fusca, articulo primo et basi articuli secundi rostri, coxis et trochanteribus omnibus annuloque medio femorum posteriorum pallide testaceis. Caput dimidia latitudine basali pronoti paullo latius, e latere visum fere verticale, ab antico visum subæque altum ac latum, vertice (♂) oculo duplo latiore, angulo faciali acuto, clypeo e latere viso a fronte bene discreto, leviter prominente, apicem versus nonnihil retrorsum vergente, oculis genis paullo altioribus, bucculis distinctis, medium gulæ attingentibus, rostro basin coxarum posticarum attingente, antennis subtiliter pilosulis, articulo primo capite ab antico viso distincte brevior, secundo primo paullo graciliore et fere duplo longiore, sublineari, basin versus non nisi levissime gracilescente (ceteri articuli desunt). Pronotum longitudine fere dimidio latius, apice vertici cum oculo uno æque latum, basi quam apice fere $2 \frac{2}{3}$ latius, strictura apicali latitudine articuli primi antennarum evidenter longiore, medio quam lateribus paullo brevior, margine ejus apicali leviter sinuato, callis strictura apicali longioribus, una cum hac partem circiter tertiam apicalem pronoti occupantibus, disco modice declivi, marginibus lateralibus ab angulis humeralibus usque ad stricturam rectis, margine basali ante scutellum vix sinuato. Margo acetabulorum anticorum ultra latera pronoti e supero visi non prominens. Hemelytra abdomine longiora, cuneo distincte declivi, apicem abdominis subattingente, fractura obliqua, areola majore membranæ apicem cunei vix superante. Pedes molliter pilosuli, tibiis anticis femoribus æquilongis, tibiis mediis et præsertim posticis femoribus multo longioribus, articulo primo tarsorum secundo plus duplo longiore. — ♂. Long. 4.5, cum membr. 5.5 mill.

By the acute facial angle this little species is allied to *P. Zetterstedti* STÅL, but it is much smaller and quite differently coloured with the second tarsal joint much shorter.