

pronotum; the corium is gibbous behind the middle, the cuneus finely punctured and its incisure very deep when looked at from the side.

Monalotion Reuteri n. sp.

Nigrum, macula laterali ad basin capitis, scutello, basi clavi, triente basali corii, tibiis anterioribus annuloque pone medium femorum posticorum flavo-testaceis, pronoto a basi usque ad stricturam, prosterno (excepto limbo apicali) ac mesosterno toto ferrugineis, articulis duobus primis rostri fuscis, duobus ultimis testaceis, ventre (exceptis dimidio apicali segmenti penultimi, ultimo genitalique) obscure sanguineo, coxis et femoribus anticis dimidioque apicali femorum mediorum fusco testaceis. Caput basi pronoti $\frac{1}{4}$ angustius, vertice retrorsum declivi, medio sulco tenui longitudinali et utrinque prope hunc impressione parva oblonga praedito, rostro coxas medias subattingente, articulo primo medium gulae attingente, secundo primo æquilongo, tertio secundo nonnihil longiore, quarto secundo et tertio unitis paullo brevioribus, antennis, articulo primo glabro excepto, erecte sat dense nigropilosis, pilis latitudine antennarum longioribus, articulo primo diametro perpendiculari oculi æque longo, parte minus quam dimidia basali oblique angustata, articulo secundo primo quintuplo et latitudine capitis paullo plus quam triplo longiore, articulo tertio secundo distincte brevioribus (art. quartus deest). Pronotum aequale longum ac latum, strictura apicali convexa, mox ante basin transversim impressa, callis distinctis, angustis, intus late distantibus, marginem lateralem haud attingentibus, disco posteriore leviter declivi, transversim fortius convexo, margine basali subrecto, medio in lobulum parvum rotundatum producto. Scutellum totum convexum. Membrana nigro-fumata, cellula apicem cunei nonnihil superante. Alae abdomine multo longiores, nigro-fumatae, fortiter iridescentes, apicem cellulae membranae attingentes. Pedes anteriores parcius subfusco-pilosi. Pedes postici densissime breviuscule nigro-pilosi, parte minus quam dimidia apicali femorum tamen parce pilosa, femoribus parte plus quam dimidia basali curvatis et subfusiformiter incrassatis, pone partem incrassatam constrictis, deinde iterum incrassatis, annulo flavo partem constrictam occupante, tibiis leviter curvatis. Articulus ultimus tarsorum apicem versus levissime incrassatus. — ♂. Long. 7.5, cum membr. 10 mill.

At once distinguished by the structure and pilosity of the hind legs. The next of kin seems to be *M. pilosipes* KIRK.