

tibus, postice usque ad trientem basalem disci extensis. Commissura clavi scutello (sine mesoscuto) aequae longa; cuneus subaeque longus ac latus; cellula interior membrana apice angulata, exterior parva sed distincta, oblongo-triangularis. Long. ♂ 3.5, incl. tegm. 4 mm.

Luzon : Mt. Banahao.

The second joint is lacking in one antenna, and as it in the other is less than one half longer than the first, I suppose its apex is broken off.

Coming nearest to *P. Lewisii* Dist., which is larger, quite differently coloured and, if the description be correct, with only one cell to the membrane.

***Peritropis setosicornis* n. sp.**

Oblonge ovalis, nigra, capite, pronoto, apice scutelli limboque laterali propleurae ochraceis, capite superne et pronoto ad limbos omnes fusco-irroratis, macula parva basali media pronoti nigra, corio et clavo maculis numerosis minutis ochraceis in series longitudinales plus minusve regulares ordinatis ornatis, cuneo impicto, membrana fumosa, iridescente, immaculata, solum ad apicem cunei anguste hyalina; antennae et rostrum fulva, illarum articulis duobus ultimis cum summo apice secundi fuscis; coxae anteriores nigrae, apice cum trochanteribus dilute testaceae, posticae cum trochanteribus livide testaceae; femora nigra, apice anteriorum fusco-tinctae, apice cum tarsis pallide flavidae. Caput pronoto distincte longius, parte anteoculari a supero visa oculo sesqui longiore, vertice oculo paullo minus quam duplo latiore, paullo ante basin linea transversa impressa levissime curvata percurrente et medio impressione brevi longitudinali postice impressionem transversam haud attingente instructo, antennis (articulo primo excepto) sat dense suberecte setosis, articulis duobus primis crassiusculis, duobus ultimis gracillimis, primo parte sua minus quam dimidia apicem capitatis superante, secundo primo fere quadruplo longiore et latitudine basali pronoti circiter (quarta parte longiore, subparallelo, rostro coxas posticas nonnihil superante. Pronotum capite vis duplo latius, transversim leviter convexum, lateribus rectis, angulis humeralibus rotundatis, basi late levissime sinuata, callis sulco tenui separatis, antice usque ad angulos apicales extensis, collare tegentibus, postice ad trientem basalem disci extensis. Commissura clavi scutello (sine mesoscuto) aequae longa; cuneus distincte longior quam lator; cellula interior membrana apice acute angulata, exterior oblongo-triangularis. Long. ♂ 8.5, incl. tegm. 4 mm.

Palawan : Puerto Princessa.