

By the unspotted membrane agreeing with the Indian *P. suturella* POPP., but quite distinct from it in its other characters.

Peritropis electilis n. sp.

Ovalis. Caput fuscum, supra minute et dilute flavido-irroratum; pronotum fuscum, macula transversa apicali et atomis compluribus pallide flavidis, maculis tribus basalibus parvis ante mesoscutum albis; scutellum fusco-nigrum, ad latera obsolete pallido-notulatum, apice pallide flavido; corium cum clavo cinereum, sparsim fusco-maculatum, lineola arcuata apicali ante cuneum, pallide flavida, embolio fusco, serie macularum parvularum pallide flavidarum notato, cuneo fusco, parce minutissime flavido-atomoso, margine interiore pallide flavido; membrana fumosa, iridescens, guttulis dilute flavidis conspersa; pectus et abdomen fusco-nigra, macula laterali, orificiis margineque angusto postico metasterni albidis; antennae fusco-nigrae, annulo subbasali et angustissimo apicali articuli primi et annulo angusto medio summoque apice secundi albido-flavis (art. duo ultimi desunt); rostrum fusco-testaceum; pedes albi, annulo dimidii apicalis et apice femorum atque annulis duobus antemedianis et uno postmediano tiliarum fusco-nigris. Caput latius quam longius, pronoto aequo longum, parte anteculari a supero visa oculo paullo brevior, vertice oculo paullo latiore, in longitudinem breviter sed distincte impresso, articulis duobus primis antennarum subglabris, primo clavato, parte minus quam dimidia apicem capitis superante; secundo primo vix triplo longiore et apici hujus aequo crasso, lineari, latitudine capitis sesqui longiore et latitudine basali pronoti paullo brevior, rostro coxas posticas paulum superante. Pronotum capite minus quam duplo latius, transversim sat fortiter convexum, lateribus rectis, angulis humeralibus vix rotundatis, basi late levissime sinuata, callis subconfluentibus, modo impressione obtusa sat obsoleta separatis, antice productis et partem mediam collaris tegentibus postice usque ad quadrantem basalem disci extensis. Commissura clavi scutello (sine mesoscuto) fere longior; cuneus aequo longus ac latus; cellula interior membranæ apice angulata, exterior parvula, breviter triangularis. Long ♂ 2.3, incl. tegm. 2.7 mm.

Luzon: Mt. Maquiling.

Allied to *P. pusilla* POPP.; the head and pronotum are differently shaped and the legs differently coloured.