

Über einige äthiopische *Miridae* (Hem. Het.).

Von Dr. E. Bergroth †.

Megacoelopsis fasciata Popp.

Von den beiden letzten Fühlergliedern, die den Typen fehlten, ist das dritte $\frac{1}{3}$ kürzer als das zweite, bräunlich, gegen die Basis heller, das vierte halb so kurz wie das dritte, braun, das Basaldrittel weiß. Die Art wurde von Mombasa beschrieben; die von mir untersuchten Stücke wurden von Dr. Bayer bei Tsavo in Brit.-Ostafrika gefangen. Die auf —*ops* und —*opsis* endenden Namen sind alle weiblichen Geschlechts, nicht Masculina, wie sie von Poppius behandelt wurden.

Eurystylus mutabilis n. sp.

Niger, capite superne (interdum linea media antice breviata excepta), vitta media pronoti postice angustata et plerumque abbreviata, scutello ac corpore toto inferiore pallide flavotestaceis, parte saltem dimidia basali cunei rufa, membrana hyalina, apice imprimis externe nigro-fumata et ramum nigricantem apicem cellulae interioris versus emittente, venis nigris; antennae nigrae, articulo primo (summo apice excepto) rufoluteo, articulis duobus ultimis basi anguste albis; rostrum et pedes flavotestacea, tarsis infuscatis. Caput latitudine interhumerali pronoti duplo angustius, vertice (♀) oculo uno saltem duplo latiore, antennis infra medium marginis antici oculorum insertis, capiti, pronoto scutelloque unitis subaeque longis, articulo primo capiti subaeque longo, lineari, modice et ubique aequaliter incrassato, solum basi subito angustato, secundo primo circiter duplo longiore, a basi ad apicem sensim incrassato, apice collari pronoti fere aequae lato, duobus ultimis unitis primo distincte longioribus, rostro coxas medias attingente. Pronotum basi ante scutellum haud sinuatum. Scutellum levissime convexum. Elytra apicem abdominis parte circiter dimidia membranae superantia. Tibiae vix spinulosae. Long. ♀ 5—5,5, incl. elytr. 6—7 mm.

Var. a: Discus posterior pronoti magna parte obscure rufescens. Macula oblonga corii ad suturam clavi, macula oblonga apicali clavi maculaque rotundata prope angulum apicalem anteriorem corii flavis, his maculis saepe obsoletis. Venter (interdum etiam meso- et metapleurae) serie intralaterali macularum parvarum nigricantium, una in quoque segmento, notata.

Var. b: Margo basalis pronoti ante clavos anguste flavidus. Scutellum infuscatum, basi et maculis duabus parvis subapicalibus pallescentibus.