

Congo belg. (Mayumbe, leg. Deleval); Africa centr. (Ituru, leg. G y l d e n s t o l p e).

Mit *E. capensis* Dist. etwas verwandt, aber durch mehrere Merkmale von ihm verschieden.

✓ *Tracheluchus* n. gen.

Corpus oblongum, impunctatum, opacum. Caput pronoto sine collari aequo longum, altitudine sua basali duplo et dimidio longius, horizontale vel nonnihil nutans, exsertum, parte postoculari retrorsum levissime angustata, oculis paullo breviore, vertice immarginato, spatio interoculari oculo uno paullo latiore, jugis apice acutis, clypeo ante haec sat longe producto, basi a fronte impressione leni discreto, oculis prominulis, ab apice pronoti sal longe remotis, a supero visis oblongulis, a latere visis oblique ovalibus, gula longa, recta, antennis paullo ante oculos insertis, dimidio corpore paullo longioribus, articulo primo parte anteculari capitidis paullo longiore, a basi ad apicem sensim modice incrassato, secundo primo paullo minus quam triplo longiore, latitudine basali pronoti longiore, a basi ad apicem fortius incrassato, articulis duobus ultimis ceteris multo gracilioribus, linearibus, unitis secundo multo brevioribus, rostro coxas anticas paullum superante, articulo primo marginem anticum oculi paullum superante, secundo apicem prosterni paullum superante, tertio secundo breviore et quarto subaeque longo. Pronotum inter humeros quam apice paullo minus quam triplo latius, lateribus obtusum, sinuatum, lobo postico fortius, antico levius vel parum declivi, angulis lateralibus anguste rotundatis, haud prominulis, margine basali medio recto, callis mox pone collare positis, minusculis, contiguis vel subconfluentibus, latera non attingentibus, quadrantem apicalem pronoti postice parum superantibus. Mesoscutum ex parte detectum. Scutellum parum longius quam latius, lobo postico pronoti subaeque longum, leviter convexum. Elytra apicem abdominis imprimis in mare longe superantia, extus a basi ultra medium corii parallela, venis corii et clavi parum distinctis, commissura hujus scutello longiore, cuneo declivi, nonnihil extrorsum vergente, fere triplo longiore quam latiore, incisura sat profunda, paracuneo distinto, cellula interior membrae apicem cunei paullum superante, apice acute angulata. Coxae anticae medium mesosterni haud attingentes; femora posticae ceteris paullo crassiora, apicem abdominis superantia (σ) aut attingentia (φ); tibiae anticae compressae, nonnihil dilatatae; articulus primus tarsorum posticorum secundo subaeque longo, tertio ceteris unitis paullulo breviore.

Diese sehr ausgezeichnete Gattung ist mit *Proboscidocoris* Reut.