

mox ante medium oculorum insertis, articulo primo capiti sub-aeque longo, lineari, solum prope basin angustato, secundo primo graciliore et plus quam duplo longiore, latitudini interhumerali pronoti fere aeque longo, a basi apicem versus sensim parum incrassato, tertio primo tertia parte longiore, rostro apicem coxarum mediarum subattingente, articulo primo medium xiphi prosterni attingente, a gula distante. Pronotum sat fortiter declive, inter humeros quam apice circiter triplo latius, lateribus rectum, angulis lateralibus anguste rotundatis, margine basali subrecto, collari lateribus acuminato, callis parum distinctis. Mesoscutum lateribus detectum. Scutellum paullo longius quam latius, leviter convexum. Elytra (♀) dimidia membrana apicem abdominis superantia, commissura clavi scutello paullulo brevior, venis corii parum distinctis, paracuneo distincto, introrsum et paullo antrorsum directo, cuneo declivi, latitudine sua plus quam duplo longiore, incisura leni, fractura obliqua, cellula interiore membranae apicem cunei paullum superante, apice subacute angulata. Vagina feminae ultra medium ventris producta. Coxae anticae medium mesosterni attingentes. Articululus primus tarsorum anticorum secundo distincte longior.

Auch diese Gattung stelle ich in die Nähe von *Probosciodocoris* Reut., aber wegen des kurzen Kopfes mit anders gebildeten Jugs, und wegen des langen ersten Gliedes der Tarsen kann das Tier nicht in dieser Gattung Platz finden. Zwar fehlen die Hinterbeine bei dem Typus, aber da bei den *Miriden* das erste Tarsenglied der Hinterbeine in der Regel etwas länger als bei den vorderen Beinen ist, so müssen wir annehmen, daß dies auch bei *Plesiocapsus* der Fall ist.

*Plesiocapsus pictus* n. sp.

Rufotestaceus, pilis brevissimis concoloribus subadpressis obsitus, subtus pallidior, maculis duabus parvis ante medium pronoti pone callos, marginibus lateralibus prothoracis et corii cum epipleuris hujus, macula oblonga medio coarctata (fere caligiformi) dimidii postici corii, vitta angusta hujus antice et postice abbreviata ad suturam clavi commissuraque hujus fere usque ad apicem nigris, cuneo rufo, membrana fusconigra, striola brevi obliqua pone apicem cunei pallida, venis rufescentibus; antennae fusconigrae, articulo primo rufotestaceo (quartus deest); rostrum et pedes antici rufotestacei, tarsi apice fuscis (pedes posteriores mutili, saltem coxis rufotestaceis). Articululus secundus antennarum apice collari pronoti paullo latior. Pronotum transversim subtilissime rugulosum. Long. ♀ 6,2 mm, incl. elytr. 7,5 mm.

Congo belg. (Dima, leg. A. Koller).