

obsoletioribus; membrana hemelytrorum brevi. Long. 4, lat. 1 millim.

Var. *a.* capite virescente, subtus, macula postica verticali, rotunda, lineis duabus intraocularibus obliquis, postice conjunctis apiceque, nigris.

In gramine locis umbrosis mense Augusto prope Holmiam passim legi. Ad Carlberg frequenter visus.

Mas Statura fere *Capsi globiferi*, sed nonnihil minor, pallidior, femina membrana semper destituta. Caput sub-triangulare, modice convexum, nigrum, nitidum, pilis nonnullis cinereis adpersum, orbitis oculorum antice maculaque intraoculari oblonga, longitudinali, dilute virescentibus, collo mediocri, posterius angustato prothorace adfixum; rostro inflexo, dilute virescente; oculis rotundatis, convexis, nigris. Antennæ tenues, pubescentes, corpore breviores, dilute virescentes, articulo primo capite transverso nonnihil longiore, ante apicem interdum infuscato, secundo præcedente plus duplo longiore, basi apiceque fusco-annulato, tertio et quarto tenuioribus, fuscis, illo basi anguste pallido-annulato, simul sumtis præcedente parum longioribus. Prothorax latitudine postica vix longior, antice truncatus, angustior, posterius in mare citius, in femina parum ampliatus, supra modice convexus, dilute virescens, nitidus, sub-lævis, griseo-pubescentis, pone apicem utrinque macula laterali nigra, intra apicem et in medio tenuiter, transversim contractus, inter stricturas elevatus, medio canaliculatus. Scutellum triangulare, dilute virescens, griseo-pubescentis, supra paullo convexum, basi fascia angusta, transversa, postice bi-sinuata maculaque apicali longitudinali, plus minusve distinctis, fuscis notatum. Hemelytra pallida, rigide fusco-pubescentia, macula parva apicali corii fusca. Corpus dilute virescens, nitidum, pube grisea adpersum, ano maris clavato, dilute flavescente. Pedes longi, graciles, dilute virescentes, pubescentes; femoribus maculis parvis, sparsis, fuscis notatis; tibiis posticis extus tenuiter, parce fusco-spinulosis; tarsis apice dilute infuscatis.

33. *Capsus pellucens*: oblongo-ovatus, niger, cinereo-sericeus; antennis articulo primo apice albedo; prothorace brevi, antice dilute sordide flavescente; hemelytris sordido albidis, immaculatis, membrana concolore; abdomine subtus medio late pedibusque dilute flavo-virescentibus. ♀. Long. 2½, lat. 1½ millim.

In gramine locis umbrosis ad Holmiam individuum unicum mense Julio legi.

Parvus. *Capso magnicorni* minor. Caput sub-triangulare, supra modice convexum, nigrum, nitidum, sub-læve; rostro inflexo, dilute flavescente, apice leviter infuscato; oculis rotundatis, convexis, nigris. Antennæ longitudine hemelytrorum, sub-tenues, nigro-fuscae, pubescentes, articulo primo capite transverso parum longiore, basi tenuiore, apice albedo, secundo primo 2½ longiore, ultimis duobus tenuioribus, simul sumtis præcedente parum brevioribus, apicali brevissimo. Prothorax brevis, transversus, antice truncatus, capite nonnihil angustior, lateribus sensim, basin versus citius oblique ampliatus, postice leviter rotundato-emarginatus, supra modice convexus, fusco-niger, sub-lævis,