


Coloração geral: Amarelo ao flavo-amarelado, segmento I da antena, ápice do II, faixa post-ocular, mesoescuto e escutelo, exceto manchas, ápice do clavo, manchas na região apical externa do cório, ápice do cúneo e segmento III dos tarsos, pretos.



Macrolophus cuiabanus n. sp. — Fig. 9: Macho, aspecto geral; fig. 10: falo; fig. 11: harpágon esquerdo; fig. 12: harpágon direito.

Genitália do macho: Falo (fig. 10) com 3 espinhos grandes longitudinais e um menor transversal, sem denticulos internamente. Harpágon esquerdo (fig. 11) em gancho, chanfrado de um lado, com algumas cerdas na região dorsal. Harpágon direito (fig. 12) pequeno terminando em ponta aciculada.

Planta hospedeira: Desconhecida

Distribuição geográfica: Mato Grosso, Brasil (Chapada). *Holótipo:* 1 fêmea; *álotipo:* 1 macho. *Paratipo:* 1 macho, na coleção do autor. A genitália do paratipo acha-se montada em lâmina.

Macrolophus aragarsanus n. sp.

(Figs. 13-15)

Caracterizada pela coloração e genitália do macho.

Macho: Comprimento 3,4 mm.; largura 0,8 mm. **Cabeça:** 0,4 mm., vértice 0,20 mm. **Antenas:** segmento I, comprimento 0,3 mm.; II, 0,9 mm.; III,