

## Mirídios neotropicais, XXXIX: Sôbre duas espécies novas do Brasil (Hemiptera).

JOSÉ C. M. CARVALHO.

Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Com 5 figuras no texto.

Apresentado aos de 16de outubro 1950 por HÅKAN LINDBERG e RICHARD FREY.

Convidado pelo Dr. H. LINDBERG para colaborar no livro em homenagem ao grande hemipterologista do passado, Prof. Dr. O. M. REUTER, prontamente aceitamos essa incumbência que, para nós, é uma honra, dada à admiração dedicada ao eminente mestre e cientista que por tantos anos trabalhou nos hemipteros do mundo inteiro, contribuindo para o conhecimento de várias espécies da fauna brasileira.

Elaborando o presente trabalho, desejamos prestar uma homenagem ao insigne mestre do passado e à sua pátria de origem, reconhecendo o mérito de seus trabalhos. Apresentamos descrições de duas espécies novas de mirídios do Brasil, agradecendo a colaboração dos colegas, Drs. REECE I. SAILER do U.S. National Museum e Dr. ARISTOTELES SILVA do Ministerio da Agricultura do Brasil, que gentilmente forneceram material para estudo.

### *Pychnoderes palustris* n. sp.

(Figs. 1—4)

Caracterizada pela sua coloração, forma do pronoto e genitália do macho.

M a c h o: comprimento 3,7 mm, largura 1,3 mm. C a b e ç a: comprimento. *Soc. Scient. Fenn., Comm. Biol. XII. 7.*