

9. APHANOSOMA ITALICUM, Ach. Costa.

A. corpore elongato subcylindraco; elytris postice oblique truncatis apice subrotundatis abdomine plus minusve brevioribus : nigropiseus antennarum articulo primo flavo, reliquis..... pronoti margine postico tenuissime flavo; elytris ♂ bruneis basi apiceque flavis, ♀ flavis postice margine interno bruneo; pedibus.....

Long., 3, 3 lig. 1/2; larg., 3/4 de lig.

Tête triangulaire, plus longue que large, arrondie sur les côtés : lobe intermédiaire plus long et plus élevé que les latéraux, arrondi en dessus.

Yeux ovales, placés obliquement dans les angles postérieurs de la tête, et saillant au dehors du bord antérieur du prothorax.

Bec mince atteignant la naissance des pattes postérieures.

Antennes insérées au devant des yeux sur les bords latéraux de la tête. Premier article plus court que la tête, subfiliforme, grossissant un peu vers l'extrémité : les autres.....

Prothorax cylindrique plus long que large : bord antérieur droit, le postérieur largement échancré dans le mâle, presque droit dans la femelle : sa surface, vue à la loupe, un peu ridée en travers et avec un sillon transversal très léger près du bord antérieur.

Écusson triangulaire plus long que large.

Élytres à partie membraneuse avortée, plus courte que l'abdomen, coupées obliquement en arrière et arrondies au bout.

Abdomen aplati en dessus, très bombé en dessous, plus large vers le tiers postérieur.

Pattes.....