

Dictyonota erythrophthalma GERM. Ahr. Fn. Eur. 3: 25. Ett hann-exemplar vid Hoburg på Gottland d. 5 Juli 1841. I Skåne är honan fångad af Magister THOMSSON d. 7 Maj 1849 i trakten af Malmö. (Utom Sverige är den funnen i Böhmen på Trojaön vid Prag af FIEBER, på Senecio Jacobæa; vid Halle och Leipzig under stenaar af GERMAR; i England af MARSHAM; men mycket sällsynt).

Famil. Aradidæ nob.

Aradus depressus FABR. På tallstubbar vid Sanda d. 26 Juni.

Famil. Reduvidæ STEPH.

Coranus subapterus DE GEER. Under torra lafvar vid Sanda exercisplats d. 26 Juni.

Famil. Phytocoridæ nob.

Halticus ambulans FALL. ♂. Vid Westös på Hall d. 28 Juli på blommor.

— *erythrocephalus* FALL. ♀. På nässlor vid Guthe d. 11 Juli.

Pilophorus clavatus LIN. I Rudalund och vid Berga ruin d. 5—7 Juli på björk- och tallbuskar.

Cyllecoris vittatus nob.: *elongatus*, $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. decimal. long., sublinearis, niger; pedibus fulvis; antennarum scapo (crasso, subconico) apice, elytrisque vittis 2 lateralibus, albis; abdominis margine laterali testaceo; antennis elongatis, corpore paullo brevioribus, flagello tenui, filiformi.

Mas: hemelytris completis, abdomine longioribus, parte coriacea griseo-fusca sub-pellucida, ad marginem externum vitta valida testaceo-albida, membrana apicali magna, sordide hyalina,