

långa,  $\frac{1}{4}$  kortare än kroppen, trådformiga, ungefär af samma tjocklek som främsta tibia. Thorax plattkullrig och liksom täckvingarne beströdd med bleka tilltryckta hår som lätt afnötas; pronotum trapezlik. Täckvingarne hvita, genomskinliga samt i och för sig glasklara, men de hår som ligga strödda på deras öfre sida, och hvilka hår hos honan något stöta i brunt, ge dem ett mindre klart utseende; de väcka med hela apikal-membranen utöfver analspetsen; apikalmembranen rökig med 2:ne klara hvita fläckar: den ena äggformig, ligger emellan cunei spets och costa, den andra är en smal tvärstrimma som ligger midt inunder den första fläcken och med densamma nästan tyckes sammanhänga; vingfalten vattenklara med en mörkbrun, liten, elliptisk fläck i det bakre eller inre fältet som är störst, ådrorna hvita. Hinvingarne perlmorhvita, iriserande med fina hvita ådror.

*Phytocoris chorizans* Fall. ♂. 1 exemplar i Rudalund d. 7 Aug. på *Salix caprea*.

*Phytocoris viridipennis* ZETT.: parvus  $1\frac{1}{4}$  lin. decimal. long., robustus, luteus, oculis nigro-brunneis; hemelytris viridibus, fusco-hirsutulis, abdomine paullo longioribus, membrana apicali albo-hyalina, cellulis viridibus. ♀.

I gräset på en äng vid Kyrkbinge näs på Gottland upptäcktes denna art d. 5 Juli 1841 af Professor ZETTERSTEDT.

Liknar mycket *Phyt. Ericetorum* FALL., men skiljes lätt derigenom att kroppen (hos *Ph. viridipennis*) är något drygare, täckvingarnes läderartade del är helt och hållet enfärgadt gräsgrön, apikalmembranens fält hafva alldeles samma färg och consistens som corium; då deremot hos *Phyt. Ericetorum* kroppen är något smärtare, täckvingarnes