

Stirnschwiele zusammengedrückt dreieckig, oben weit vorstehend. Mittelbrust nach hinten verkehrt-eiförmig zusammengezogen, spitz, herabgewölbt. Ein Pronotum-Mittelkiel.

Gen. 10. *Trigonotylus* Fieb. *ruficornis* F. a. l. (*Miris*.)

CC. Pronotum vorn mit Randkiel oder ringförmigem Wulst.

○ Pronotum-Seiten blattartig, oder geschärf-kantig. Schnabelwurzel länger als der Unterkopf.

§ Scheitelende in einen starken aufstrebenden, die schief nach unten und hinten geneigte Schwiele überragenden Kegel endend. Pronotum-Seiten und Mittelkiel blattartig. Mittelbrust hinten eckig zusammenggezogen. Gen. 11. *Acetropis* Fieb. *carinatus* H.-S. (*Lopus*.)

§§ Scheitelende zugrundet. Pronotum-Seiten kielförmig-geschärf, Schwielengrund in der Linie des unteren Augenrandes.

† Augen an den Kopfseiten halbkugelig. Schnabel an das Ende der Hinterbrust, Wurzelglied an das Xyphusende reichend. Kehle kurz, schief. Mittelbrust hinten zugrundet. Hinterbrust rechtwinkelig stumpf. Gen. 12. *Leptopterna* Fieb. *dolabrata* F. a. b. (*Lopus*)

†† Augen an den Kopfseiten nierenförmig, von oben eingesenkt*). Schnabel an das Ende der gestützten Mittelbrust reichend, Wurzelglied viel kürzer als der Unterkopf. Hinterbrust mit querbeilförmigem Endstücke. Pronotum fast kegelig, vor den Schultern etwas geschweift. Halbdecken lederartig, unvollkommen mit rautenförmiger Endzelle.

Gen. 13. *Teratocoris* Fieb. *antennatus* Bohem. (*Caps*.) Nya Svensk H.

- ○○ Pronotum-Seiten stumpf oder abgerundet.

— § Hinterfusswurzel nicht dicker als die übrigen Glieder.

† Führglied 2 keulig, 3 und 4 walzig. Flügelzelle mit Haken. Kopf schief-gestreckt, verschmälert.