

Schnabel auf die Bauchmitte. Wurzelglied etwas auf den Xyphus reichend. Mittelbrust hinten rundlich-zweilappig. Hinterbrust zugerrundet, gewölbt.

Gen. 14. *Cremnoides* Fieb. *umbrahitis* F ab. (*Caps.*)

‡ Fühlerglied 2—4 stabförmig. Flügelzelle ohne Haken.

a. Kopf schief-gestreckt. Stirnschwiele gleichbreit vorstehend. Kehle lang, schief. Schnabel auf die dritte Bauchschiene. Wurzelglied über den Xyphus lang. Mittelbrust rundlich-klein-zweilappig. Hinterbrust kurz, stumpf-eckig. Fühlerwurzel walzig, lang.

Gen. 15. *Oncognathus* Fieb. *binotatus* F ab. (*Caps.*)

aa Kopf von der Seite fast kugelig. Gesicht übergeneigt, Schwiele übergehend. Schnabel dick, auf den Bauchgrund. Wurzelglied an das Xyphusende reichend. Glied 2 zum Ende verdickt. Mittelbrust hinten zusammengezogen eckig. Hinterbrust halbrundlich, gewölbt. Fühlerwurzel kurz, keulig. . . . . Gen. 16. *Pithanus* Fieb. *Märkeitii* H.-Schff. (*Caps.*)

§§ Hinterfußwurzel viel dicker als die übrigen Glieder.

† Hinterfußwurzel dick walzig. Fühlerglied 2 nach oben keulig, 3—4 spindelig. Kopf horizontal-gestreckt. Schwiele übergehend. Augen sphäroidisch. Schnabel schlank, an das Ende der Hinterbrust reichend, Wurzelglied so lang als der Unterkopf. Mittelbrust hinten breit, seicht ausgeschweift. Hinterbrust eckig, Mitte dachförmig-kantig.

Gen. 17. *Alloestomus* Fieb. *gothicus* Fall. (*Caps.*) (*marginepunctatus* H.-Schff.)

†† Hinterfußwurzel dick keulig. Fühlerglieder stabförmig. Kopf und Gesicht schief. Kehle kurz, Schwiele vorstehend. Schnabel auf die zweite oder dritte Bauchschiene, Wurzelglied dick, an

\*) Wenn der Kopf zur Aufnahme des Auges etwas ausgeschnitten ist.