

$\alpha\alpha$ Scheitelende zur Stirne herabgewölbt.

β Kopf vertical. Augen lang. Stirnschwiele wenig vorstehend. Schnabel auf die zweite oder dritte Bauchschiene reichend, Wurzelglied sehr dick, über den Xyphus lang. Mundhöhle gross; offen Fühlergrube fast in der Augenlinie. Mittelbrust hinten abgestutzt. Hinterbrust breit, stumpf, flach gewölbt.

Gen. 21. *Megaceelum* Fieb. *infusum* H.-Schff. (*Caps.*)

$\beta\beta$ Kopf im Viertkreis gewölbt, mit kurzer Kehle. Schwiele stark vortretend. Schnabel auf die zweite Bauchschiene, Wurzelglied stark, an das Xyphusende reichend. Fühlergrube in der Mittellinie der unteren Augenhälfte. Fussglieder stark. Mittelbrust hinten eingekebt. Hinterbrust stumpfeckig mit dicker Schwiele.

Gen. 22. *Madredemus* Fieb. *ferrugatus* F a b. (*Caps.*) — *marginellus* F a b. (*Caps.*)

aa. Hinterfusswurzel kürzer als Glied 2.

* Schnabel kurz, auf die Mitte der Mittelbrust reichend. Wurzelglied dick, viel kürzer als der schmale Unterkopf. Kehle schief. Kopf und Gesicht vertical. Stirne fast überhängend. Mittelbrust fast abgestutzt, eingekebt. Hinterbrust stumpfeckig, gewölbt.

Gen. 23. *Brachycoleus* Fieb. *scriptus* F a b. (*Caps.*)

** Schnabel hinter das dritte Hüftpaar, oder auf die Bauchmitte reichend.

α Pronotum trapezförmig mit geraden Seiten.

β Schnabel auf die zweite Bauchschiene, Wurzelglied dick, an das Xyphusende reichend. Kopf vertical mit schiefer Kehle, verschmälert. Mittelbrust hinten eingekebt. Hinterbrustmitte eckig vorstehend, gewölbt. Hinterfussglied 3 länger als 2, Fühlerwurzel walzig.

Gen. 24. *Calocoris* Fieb. *chenopodii* Fall. — (*Phytoc.*) *affinis* H.-Schff. —

alpestris Mey. — *pilicornis* H.-Schff. etc. im Nachweisungsregister.