

Mittelbrust hinten fast abgestutzt, klein eingekerbt. Hinterbrust breiteckig, gewölbt. Fussglieder schlank. Gen. 42. *Ligus* Hah. *contaminatus* Fall. *chloris* Fieb. *Spinolae* Mey. (*Caps.*) etc. im Register.

**aa** Schnabel auf die Mitte der Hinterbrust, Wurzelpunkt dick, auf den halben Xyphus lang. Glied 3 kürzer als 4. Stirne stark gewölbt. Schwiele sehr vortretend, vertical. Mittelbrust gewölbt, hinten sehr stumpfseitig, klein eingekerbt. Hinterbrustmitte klein, stumpf vorstehend mit Schwiele.

Gen. 43. *Poecilosecytus* Fieb. *unifasciatus* Fall. — *cognatus* Fieb.  
*Dalmanni* Fall. (*Caps.* H.-Sch.)

**aa.** Stirnschwiele in den Scheitel bogig übergehend. Kopf und Gesicht vertical. Wangenplatten breit, fast halbrundlich. Schnabel an das Ende der Hinterbrust reichend.

\* Kopf im Rechteck vertical; mit kurzer Kehle verlängert. Augen nicht über die Kopfseite herabreichend. Schnabelwurzel auf die Mitte des rinnig vertieften Xyphus reichend, abstielend. Mittelbrust hinten stumpfseitig, klein eingekerbt. Hinterbrust rechtwinkelig, mit Mittelschwiele.

Gen. 44. *Hadrodesma* Fieb. *rubicunda* Fall. — *pinustri* (*Caps.*)  
etc. im Register.

\*\* Kopf im Viertelkreis gewölbt nicht verlängert, ohne Kehle. Augen über die ganze Kopfseite herab. Schnabelwurzel dick fast über den ebenen Xyphus lang. Mittelbrust sehr flach, abgerundet mit dreieckigem Endeindruck. Fussglied 2 länger als 3.

Gen. 45. *Orthops* Fieb. *Kalmii* L. — *pastinaceae* Fall. — *fasciatus*  
Mey. — (*Caps.*) etc. im Register.

CC. Pronotum vorn ohne kiel- oder wulstförmigen Randansatz.

○ Flügelzelle ohne Haken.