

β Kopf von oben länglich-fünfeckig, spitz, seitlich fast rüsselförmig vertical durch die lange schiefe Kehle verschmälert und verlängert. Scheitel steil abfallend. Augen schiefseitig ansitzend. Pronotum rechteckig-trapezförmig, vorn gewölbt. Mittelbrust hinten breit abgestutzt, seitlich blattartig geschärft. Hinterleib birnförmig. Halbedecken lederartig, gewölbt, selten mit Membran.

Gen. 80 u. 77. *Malthacus* Fieb. (*Byrsoptera* Spin.) ♀ *ruffrons*
Fall. (*Caps.*)

ββ Kopf von oben länglich-fünfeckig, spitz, mit schiefseitig ansitzenden Augen, von der Seite gesehen schief, gestreckt und flachbögig gewölbt. Kehle schief, lang. Pronotum glockenförmig, hinten erweitert und gewölbt. Xyphus spitz mit ebenem Rand. Mittelbrust schmal, gestutzt, rinnig.

Gen. 81. *Phylus* Hahn. *metanocephalus* F. ab. — *Coryli* F. —
arellanae Mey. — *tituratus* Evers.

αα. Xyphus eben oder vertieft.

* Xyphus eben, ohne kielförmig erhobenen Rand.

α Kopf im Rechteck vertical, über die Schwielen herabgewölbt, mit kurzer Kehle. Schwielen grund etwas unter der Augenlinie. Joch und Wange schief-aufwärts geschnitten. Schnabel auf den Bauchgrund reichend, Wurzelglied wenig länger als der Kopf, dick. Xyphus spitz. Mittelbrust eben, schwach ausgerandet, vorn mit erhöhter kleiner Spitze.

Gen. 82. *Gnostus* Fieb. *plagiatus* H.-Sch. (*Caps.*)

αα Kopf im Rautenviereck gerahmt, über die Diagonale mit dem Gesichte schief, gewölbt. Kehle kurz, schief.