

*Emblethis arenarius* var. *denticollis* Horv. in SCHNEIDER Naturw. Beitr. zur Kennt. d. Kaukas. p. 79. (1878).

Patria : Hungaria, Rossia meridionalis, Transcaucasia. \*

7. *Deraeocoris trifasciatus* L. var. *regalis* Horv.

Apice capitis, articulis duobus basalibus antennarum femoribusque totis nigris; thorace, scutello hemelytrisque coccineis; callo thoracis antico, macula parva oblonga pone basin guttaque parviuscula in medio marginis apicalis corii et apice cunei nigris. ♀.

Patria : Hungaria (Gödöllő, D. GAMMEL; Körtvélyes, D. RAISZ).

\* Species mihi cognitas generis *Emblethis* hoc modo dispono:

1 (6). Articulo primo tarsorum posteriorum articulis duobus apicalibus simul sumtis distincte plus quam duplo longiore; marginibus lateralibus thoracis margineque costali hemelytrorum late dilatatis.

2 (5). Thorace transverso, subquadrato, antrorsum paulo angustato, lateribus leviter et tantum apice distincte et subito rotundatis.

3 (4). Major; articulo primo antennarum fere cylindrico, obconico; marginibus lateralibus thoracis fere nudis, tantum setis nonnullis brevissimis, marginem nunquam superantibus et aegerrime distinguendis praeditis. Long. 6—7  $\text{mm}$ . — *E. Verbasci Fabr.*

4 (3). Minor; articulo basali antennarum breviter fusiformi, fere globoso; marginibus lateralibus thoracis serie setarum sat longarum instructis. Long. 5—6  $\text{mm}$ . — *E. ciliatus Horv.*

5 (2). Thorace longiore, trapezoideo, apicem versus distincte sensim angustato, marginibus lateralibus fere rectis, ciliis longiusculis praeditis. Long. 8  $\text{mm}$ . — *E. dilaticollis Jakowl.*

6 (1). Articulo primo tarsorum posteriorum articulis duobus ultimis simul sumtis nunquam plus quam duplo longiore; marginibus lateralibus thoracis margineque costali hemelytrorum anguste dilatatis; thorace apicem versus sensim angustato, lateribus leviter rotundatis, parce setulosis.

7 (8). Marginibus lateralibus dilatatis thoracis superne planis vel apicem versus plus minus convexis (var. *bullatus Fieb.*), sed nunquam reflexis, subtus processu laminiformi destitutis; articulo basali antennarum obconico, fere cylindrico; articulo primo tarsorum posteriorum articulis secundo et tertio simul sumtis duplo longiore. Long. 5½—6½  $\text{mm}$ . — *E. griseus Wolff.*

8 (7). Marginibus lateralibus dilatatis thoracis supra apicem versus nonnihil reflexis, subtus processu laminiformi intramarginali instructis; articulo primo antennarum breviter fusiformi; articulo basali tarsorum posteriorum articulis duobus apicalibus simul sumtis tantum dimidio longiore. Long. 5—6  $\text{mm}$ . — *E. denticollis Horv.*

*E. gracilicornis Put.*, ex Arabia descriptus, sed mihi ignotus, thorace trapezoideo *E. dilaticollis Jakowl.* affinis videtur, a quo tamen marginibus laminatis thoracis totis nudis differt.