

Lygus cervinus H.-SCH. var. coccineus n. var.

Corpore superne femoribusque posterioribus apicem versus sanguineis; apice clypei, linea intramarginali basali pronoti et vittis duabus scutelli nigris; corio ad angulum internum leviter nigricante; membrana nigro-fusca, rubro-venosa, macula parva rotundata mox ante medium marginis externi basique areolarum albidis. ♀.

Serbia: Požarevac. (Mus. Hung.)

Dimorphocoris tristis FIEB.

Ovatus, in utroque sexu brachypterus, rufescenti-griseus, plus minusve ferrugineo-conspersus, interdum fere totus ferrugineus, superne pilis brevissimis griseis parce vestitus et remote nigro-setulosus; capite cum oculis basi pronoti æquilato, a supero viso pronoti medio æquilongo, vertice plano, oculo duplo latiore, maculis duabus parvis obliquis inter oculos punctisque sex ad marginem posticum nigris notato, fronte verticali, convexa; oculis magnis, prominulis, circiter $\frac{2}{5}$ laterum capituli occupantibus; antennis ab oculis paullo remotis, breviter nigro-pilosis, articulo primo setis nonnullis rigidis nigris instructo, latitudini verticis æquilongo, articulo secundo latitudine basali pronoti $\frac{1}{4}$ longiore; rostro crasso, apicem coxarum posticarum attingente, apice nigro; pronoto horizontali, transversim leviter convexo, basi longitudine sua paullo plus quam duplo latiore, apice quam basi parum angustiore, utrinque vitta latiuscula laterali postice abbreviata nigra signato, callis sat discretis, lateribus rectis, margine postico levissime sinuato; scutello transverso, sæpe linea media percurrente pallida notato; hemelytris in utroque sexu valde abbreviatis, medium segmenti secundi dorsalis abdominis haud superantibus, totis coriaceis, apice rotundato truncatis et versus medium interdum macula parva marginali nigra ornatis, angulis apicalibus externo et interno obtuse rotundatis, sutura communi scutello æquilonga; lateribus pro- et mesostethii albidis; femoribus omnibus fusco-conspurcatis, femoribus posticis elongatis, fortiter incrassatis, antice serie setarum nigrarum e punctis nigris nascentibus instructis, tibiis albido-flavescentibus, nigro-spinulosis, spinulis e punctis minutis nigris nascentibus, tarsis pallidis, apice nigris. Long. ♂ $1\frac{3}{4}$ —2, ♀ $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{1}{2}$ mill.

Orthocephalus tristis FIEB Eur. Hem. p. 292. 1. (1861).

Dimorphocoris tristis REUT. Hem. Gymn. Eur. IV. p. 97. 9. tab. III. fig. 2. (1891.)

Hispania: Ciudad Real. (Mus. Hung.) Utrosque sexus benevole misit Rev. Dom. J. M. DE LA FUENTE.