

Species parva, in utroque sexu brachyptera, haud dimorpha ab omnibus congenericis distinctissima. An ne ad novum genus referenda?

Piezocranum seminulum n. sp.

Breviter et late ovatum, nigrum, nitens; capite latitudine sua cum oculis duplo brevior et basi pronoti paullo angustiore, vertice usque a basi declivi cum fronte sensim confluyente, ante marginem posticum acutum transversim impresso, clypeo leviter arcuato, basi a fronte leviter discreto; articulo secundo antennarum latitudine verticis $\frac{1}{5}$ brevior, articulis duobus apicalibus simul sumtis articulo præcedente longioribus, articulo ultimo penultimo brevior; pronoto transverso, latitudine sua basali $2\frac{1}{3}$ brevior, callis sat discretis, lobo postico confertim rugoso-punctato; scutello subtilissime transversim aciculato; hemelytris totis coriaceis, dense impresso-punctatis, abbreviatis, apice oblique truncatis, extus usque ad apicem segmenti quarti abdominalis extensis, sed intus maximam partem segmenti quarti et partem mediam segmenti tertii detectas relinquuntibus, angulo apicali externo late rotundato. ♀. Long. $2\frac{1}{4}$ mill.

Hispania: Ciudad Real. (Coll. DE LA FUENTE et Mus. Hung.)

P. simulanti HORV. (*punctatipenni* REUT.) valde affine et simillimum, differt statura minore, capite minus transverso, vertice minus fortiter declivi, fronte et clypeo impressione obsoleta discretis hemelytrisque densius et paullo subtilius punctulatis.

Halticus asperulus n. sp.

Niger, subnitidus, pronoto, scutello et hemelytris dense distincteque rugoso-punctatis et brevissime nigro-pilosulis; capite lævigato, transverso, ab antico viso æquilateraliter triangulari, latitudine basali pronoti nonnihil angustiore, vertice acute marginato, fronte leviter convexa, clypeo apice quam medio haud latiore, basi a fronte impressione discreto, labro angusto; oculis exsertis, distincte ultra latera pronoti prominulis; articulis duobus basalibus antennarum luteis, articulo secundo latitudini basali pronoti æquilongo, articulis duobus apicalibus nigricantibus; rostro coxas intermedias haud superante, luteo, articulis primo et quarto nigris; pronoto trapezoideo, basi longitudine sua fere duplo latiore, apice quam basi circiter $\frac{1}{3}$ angustiore; hemelytris completis, apicem abdominis paullo superantibus, membrana fusco-nigra; coxis anterioribus pedibusque posticis nigris, femoribus posticis apice ipso, annulo antepicali tibiæ posticarum articuloque primo tarsorum posticorum luteis. ♂. Long. $2\frac{1}{2}$ mill.

Armenia rossica: Kasikoporan. (Mus. Hung.)