

110. *Brachycoleus thoracicus* Put. var. *coccineus* m. — Pronoto hemelytrisque coccineis; strictura apicali illius flavescente, callis strigisque duabus parviusculis transversis obsoletis mox ante marginem basalem nigris; limbo scutellari angustissimo clavi, angulo apicali externo corii nec non angulo interno apiceque cunei nigris; venis membranæ ad partem coccineis; corpore subtus nigro, vitta utrinque laterali pectoris et ventris femoribusque rubris, femoribus anterioribus tantum basi, femoribus posticis basi et apice nigris; tibiis sordide testaceis, tibiis anterioribus apice, tibiis posticis basin et apicem versus nigris. ♀. Long. 8 mill.

Akbès.

Cette belle variété diffère du type par sa coloration d'un rouge vif qui occupe presque totalement le clavus et les cories.

111. *Brachycoleus Bolivari* n. sp. — Niger, nitidus, fusco-pilosus; capite basi pronoti fere dimidio angustiore, vitta orbitali utrinque flavo-albida ornato, vertice (♂) oculo  $\frac{2}{5}$  latiore; antennis nigris, articulo primo toto trienteque basali articuli secundi aurantiacis, articulo secundo margine postico pronoti paullo brevior; pronoto latitudine sua basali circiter  $\frac{1}{3}$  brevior, convexo, antrorsum fortiter declivi, sublævi, strictura apicali, limbis lateralibus et postico, vittula mediana antice stricturam apicalem attingente, postice autem mox pone medium abbreviata lineolaque obliqua disci utrinque abbreviata flavo-albidis; scutello sat convexo, leviter transversim strigoso, apice flavo-albido; hemelytris dense minutissimeque punctulatis, vitta clavi versus basin abbreviata, macula parva ad angulum internum corii limboque angusto costali hujus flavo-albidis, limbo hoc pallido a basi tantum usque ad medium extensa ibique introrsum in vittulam brevem obliquam continuata; cuneo flavo-albido, fere dimidio apicali nigro; membrana nigricante, venis concoloribus; vitta utrinque laterali pectoris et ventris flavo-albida, margine postico segmentorum ventralium angustissime pallido; pedibus aurantiaco-rufis, tibiis annulo subapicali lato albido ornatis et apice cum tarsis nigris. ♂. Long.  $7\frac{3}{4}$  mill.

Akbès.

Cette espèce est fort voisine du *B. Steini* Reut., mais s'en distingue par le premier article des antennes et le tiers basilaire du deuxième article entièrement d'un jaune orangé, la courte ligne médiane pâle du pronotum prolongée jusqu'à l'anneau apical, le limbe costal jaune des cories très-étroit ne se prolongeant pas derrière leur milieu, le cunéus largement noir à l'extrémité, les nervures de la membrane noirâtres et par les tibias pourvus d'un large anneau antéapical blanc.

112. *Cyphodema instabile* Luc. — Akbès.

113. *Capsus rutilus* H.-SCH. et var. *bellicosus* Horv. — Alexandrette.