

114. *Camponotidea Saundersi* PUT. var. *Fieberi* REUT. — Alexandrette.

115. *Cyllocoris persimilis* PUT. — Akbès.

116. *Oncotylus viridiflavus* GOEZE. — Akbès.

117. *Oncotylus basicornis* n. sp. — Oblongo-ovalis, flavo-virens, cum antennis et pedibus ubique pilis depressis nigris sat dense vestitus; capite (φ) basi pronoti $\frac{2}{5}$ angustiore, vertice oculo duplo latiore, punctis duobus nigricantibus obsoletis signato, fronte convexa, clypeo prominente, perpendiculari, ipsa basi supra lineam inter scrobes antennarum ducendam posita; antennis flavescentibus, articulo primo basi nigro, nitidulo et præterea superne paullo pone medium punctis duobus approximatis nigris notato, articulo secundo linearci, basi pronoti paullo longiore, apice nigro, articulis duobus ultimis nigris, simul sumtis secundo æquilongis, articulo quarto tertio $\frac{2}{5}$ breviore; pronoto æquilongo ac apice lato, basi quam apice duplo latiore, lateribus subrectis, angulis posticis nigris, callis bene discretis, postice nigro-marginatis; membrana nigricante, pallido-venosa; pedibus flavescentibus, femoribus seriatim nigro-punctatis, tibiis spinulis nigris e punctis parvis nigro-fuscis nascentibus instructis, apice tibiarum tarsisque totis nigris. φ . Long. $5\frac{1}{4}$ mill.

Akbès.

Rappelle par les dessins de son pronotum à l'*O. punctiger* REUT. d'Espagne, mais sa taille plus petite et plus large et le dessus de son corps dépourvu des points noirs sériés le font aisément distinguer. Il est assez voisin de l'*O. punctipes* REUT., mais en diffère par la couleur du dessus plus verte et par les deux derniers articles des antennes noirs ainsi que par les dessins noirs du premier article de celles-ci et du pronotum.

118. *Pronototropis longicornis* REUT. — Akbès.

119. *Utopnia torquata* PUT. — Alexandrette.

Saldidæ.

120. *Salda subcoriacea* n. sp. — Ovata, nigra, supra opacula, pubescentia sericeo-fulva parce vestita, haud nigro-setosa; tylo, apice jugorum, clypeo parteque basali rostri flavo-testaceis; antennis nigris, articulo primo intus flavo-testaceo, articulo secundo fusco-testaceo, latitudine basali pronoti $\frac{2}{7}$ breviore; pronoto transverso, basi longitudine sua $2\frac{1}{5}$ et capite cum oculis $\frac{2}{7}$ latiore, lateribus arcuatissimis; hemelytris crebre subtiliterque punctulatis, apicem abdominis paullo superantibus, limbo costali per totam longitudinem reflexo, corio immaculato, membrana rudimentaria, subcoriacea, nigro-fusea, maculis pallidis destituta; alis abbreviatis, medium