

viribus, corio haud fasciato, cuneo albedo articuloque ultimo tarsorum posteriorum latitudine capitis distincte breviora certe differt.

<sup>n</sup>  
*Aaapus pectoralis* n. sp.

Oblongo-ovatus, niger, opacus, pilis albis faciliter divellendis vestitus; capite cum oculis basi pronoti aequilato, vertice usque a basi declivi et quam oculo triplo latiore, marginibus orbitalibus totis parteque capitis infra oculos et antennas sita albis, linea mediana tyli et gula brevi nigris; oculis valde exsertis, sed vix stylatis; antennis nigris, articulo primo modice incrassato, subcylindrico, sat dense nigro-spinuloso, latitudine verticis interoculari paullo breviora, articulo secundo articulo primo duplo et articulis duobus apicalibus simul sumtis vix longiora, articulo tertio articulo secundo fere  $\frac{2}{3}$  et quam articulo quarto fere  $\frac{1}{3}$  breviora; rostro (coxas posticas attingente, fusco-piceo; pronoto basi longitudine sua duplo latiore, haud ruguloso; scutello plano; hemelytris abbreviatis, totis coriaceis, partes saltem  $\frac{2}{3}$  apicales abdominis detectas relinquuntibus, apice late rotundato-truncatis, angulo apicali externo fortiter rotundato, margine commissurali margine apicali distincte breviora; pectore fere toto albo, tantum margine laterali prostethii nigro; pedibus anticis nigris, apice femorum tibiisque flavo-testaceis, basi ima et apice tibiarium nigris. ♂. Long.  $2\frac{1}{2}$  mill.

Przevalsk.

Ab *A. sibirico* SAHLB., cui affinis videtur, capite subtus et pectore fere totis albis, structura antennarum, pronoto haud fortiter rugoso, hemelytris magis abbreviatis et apice rotundato-truncatis tibiisque (saltem anticis) fere totis flavo-testaceis facillime distinguendus.

Pedes posteriores in exemplo descripto desunt.

*Scirtetellus seminitens* n. sp.

Late ovatus, deplanatus, niger, nitidus, vertice, pronoto, scutello et hemelytris opacis; capite cum oculis margine postico pronoti paullo latiore, marginibus orbitalibus interioribus, lineola mediana superiore frontis, macula utrinque ad basin tyli, macula parva infraoculari subtriangulari margineque angusto peristernii albido-testaceis, vertice inter oculos levissime excavato et quam oculo dimidio latiore, fronte sat convexa, nitida; antennis corpore distincte longioribus, nigro-pilosulis, articulo primo subcylindrico et quam latitudine interoculari verticis dimidio longiora, articulo secundo articulo primo fere triplo et quam latitudine capitis fere duplo longiora, articulis duobus apicalibus simul sumtis arti-