

culo secundo  $\frac{2}{3}$  longioribus et inter se longitudine subæqualibus; rostro flavescenti-testaceo, apice nigro, apicem coxarum posticarum attingente; pronoto planiusculo, antrorsum distincte angustato, margine postico fere duplo latiore quam longiore, lateribus subrectis; scutello triangulari, valde transverso; hemelytris incompletis, totis coriaceis, pronoto vix  $\frac{1}{3}$  longioribus, pone basin abdominis parum extensis, apice rotundato-truncatis, angulis apicalibus rotundatis; marginibus acetabulorum albidotestaceis; marginibus lateralibus imis abdominis ferrugineis; femoribus anticis apice ipso superne flavo-testaceis, tibiis posterioribus annulo subapicali lato obsolete fusco notatis et nigro-spinulosis; forcipe maris dextra latiuscula, cochleariformi. ♂. Long. 3  $\frac{1}{2}$  mill.

San-tash.

*S. brevipenni* Reur. similis, sed statura majore, vertice angustiore, antennis longioribus et alio modo constructis, pronoto antrorsum distincte angustato, marginibus lateralibus imis abdominis ferrugineis coxisque totis nigris certe distinctus videtur.

#### **Maurodactylus albidus Kol. var. pallidicornis n.**

Dilute albidoochraceus; articulis duobus basalibus antennarum saltem pro parte pallidis, articulo primo tantum extus et articulo secundo basin versus nigris vel nigricantibus. ♀.

Ilysk, Kok-Dshigde.

#### **Salda Jakowleffi Reur. var. moerens n.**

Hemelytris totis nigris, tantum puncto discoidali minuto, raro omnino deficiente, guttulaque parva interna, supra marginem apicalem corii inter bases venarum membranæ tertie et quartæ sita, pallidis notatis; membrana fusco-hyalina, nigro-venosa, angulo basali interno toto nigro. ♂. ♀:

Ara-bel.

#### **Corixa acromelæna n. sp.**

Supra flavo-testacea, subhitida, pronoto hemelytris nigris signatis; capite toto pallido, impicto; pronoto longitudine sua  $\frac{2}{3}$  latiore, lineis transversalibus angustis 9, posterioribus plus minusve fissis et abbreviatis notato, antice carinula brevi tuberculiformi instructo, postice leviter rotundato-producto, angulis lateralibus subrectis; hemelytris subtilissime rastrato-punctatis, parce flavo-pilosis, lineis transversalibus nigris clavi et corii irregularibus, dentatis et furcato-ramosis, ad basin clavi subpa-