

Harpactor punctiventris H.-Sch. — Illany-Dagh bei Kaisarie.
Nabis lativentris Boh. — Bujukdere.

Miridae.

Acetropis carinata H.-Sch. — Illany-Dagh bei Kaisarie.

Miris calcaratus Fall. — Zwischen Sabandscha und Eskischehir.

Notostira erratica L. — Zwischen Konia und Kaisarie.

Leptopterna ferrugata Fall. — Zwischen Konia und Kaisarie.

Lopus cingulatus Fabr. — Illany-Dagh bei Kaisarie.

Lopus bimaculatus Jak. — Erdschias-Gebiet. — Diese Art ist zunächst verwandt mit *L. infuscatus* Brull., von dem sie sich durch etwas geringere Größe, mehr parallele Körperform, vorne steiler abfallenden Kopf, bis hinter die Mittelhüften reichen den Schnabel, kürzeres, quer breiteres und am Hinterrande stärker ausgebuchtetes Pronotum usw. unterscheidet. Hierher gehört wahrscheinlich auch *L. infuscatus* var. & Reut., Hem. Gymn. Eur., V, p. 319.

Adelphocoris vandalicus Rossi var. *Humuli* Schumm. — Illany-Dagh bei Kaisarie.

Adelphocoris lineolatus Goeze. — Illany-Dagh bei Kaisarie.

Calocoris angularis Fieb. — Zwischen Konia und Kaisarie; Illany-Dagh bei Kaisarie; Erdschias.

Calocoris bipunctatus Fabr. — Zwischen Haidar-Pascha und Sabandscha sowie zwischen Sabandscha und Eskischehir.

Grypocoris melanopygus n. sp. — Niger, nitidus, albo-variegatus, glaber; capite fortiter nutante, laevigato, latitudine basali pronoti $\frac{2}{5}$, angustiore, pone oculos brevissime constricto, vertice parteque maxima frontis subhorizontalibus, fronte antice valde convexa et perpendiculariter declivi, clypeo a fronte bene discreto, valde prominente, basin versus arcuato, deorsum perpendiculari, angulo faciali recto, gula valde obliqua, vertice oculo $\frac{1}{4}$ (σ) vel $\frac{2}{3}$ (φ) latiore, utrinque prope oculum guttula striiformi flavo-testacea notato; oculis ab apice pronoti distincte remotis; antennis corpore cum hemelytris subbrevioribus, articulo primo capite ab antico viso paullo breviore, sat robusto, rufo-testaceo, basi nigro, articulo secundo articulo primo $3\frac{1}{2}$ longiore, fusco-testaceo, basin et apicem versus nigro, articulis duobus apicalibus nigro-fuscis, articulo tertio articulo secundo $\frac{2}{5}$ breviore, basi albido; rostro coxas intermediae haud superante, nigro, articulo primo apice articuloque secundo testaceis; pronoto latitudine sua basali paullo breviore, lateribus distincte sinuatis, strictura apicali et macula utrinque laterali antica transversa lobi postici albidis, lobo antico laevigato, subhorizontali, lobo postico antrorum fortiter convexo-declivi, transversim subtilissime ruguloso; scutello albido, laevigato; hemelytris apicem abdominis longe (σ) vel parum (φ) superantibus, dense minutissimeque punctulatis, albis, clavo (apice excepto), plaga maxima triangulari partem fere totam dimidiat apicalem corii occupante apiceque cunei nigris, limbo costali corii, apice excepto, pallido, membrana nigricante, venis concoloribus; pectore nigro, limbo antico et fascia lata media prostethii, margine postico angusto mesostethii orificiisque albidis, disco mesosterni saepissime rufo-testaceo; ventre albido, vitta lata laterali (segmenta duo basalia haud occupante) segmentisque genitalibus nigris, macula anteapicali laterali ventris albida; pedibus rufo-testaceis, coxis totis, apice tibiarum et tarsis nigris, femoribus seriatim fusco-punctatis, plerumque autem nigro-fuscis vel fusco-nigris, tibiis breviter nigro-spinulosis, interdum basi nigricantibus. ♂ ♀. Long. $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{4}$ mm.