

Poeciloscytus unifasciatus Fabr. — Illany-Dagh bei Kaisarie.

Poeciloscytus vulneratus Wolff. — Erdschias-Gebiet.

Capsus rutilus H.-Sch. mit der var. *bellicosus* Horv. — Zwischen Konia und Kaisarie.

Thermocoris Munieri Put. — Zwischen Sabandscha und Eskischehir.

Amblytylus concolor Jak. — Zwischen Karaköi und Boz-Oyuk.

Macrotylus antennalis n. sp. — Oblongo-ovatus, albido-flavovirens, supra pilis nigris facile divellendis vestitus; capite flavo, latitudine sua cum oculis sicut etiam pronoto vix breviore et quam latitudine postica pronoti dimidio angustiore; antennis corpore (cum hemelytris) fere $\frac{1}{3}$ brevioribus, sordide flavescentibus, annulo subbasali articulorum primi et secundi, articulo hoc apicem versus articulisque duobus apicalibus nigris, articulo secundo latitudine basali pronoti paullo breviore, articulis duobus ultimis simul sumtis articulo hoc longitudine aequalibus; rostro fere usque ad medium ventris extenso, articulis duobus apicalibus nigris; pronoto basi longitudine sua duplo latiore, antrorsum fortiter angustato, lateribus mox ante angulos posticos levissime sinuatis, callis anticis bene discretis, flavescentibus; hemelytris apicem abdominis distincte superantibus, puncto marginis apicalis corii juxta venam cubitalem nigro, membrana albida, venis concoloribus, areola minore fasciaque pone apicem cunei nigricantibus, puncto pone apicem venae cubitalis nigro vel nigro-fusco; xypho prosterni marginato; coxis anticis margine externo nigro-setosis; femoribus innotatis, tibiis brevissime et subtilissime nigro-spinulosis, apice ipso cum tarsis nigris. ♀. Long. $4\frac{2}{3}$ mm.

Illany-Dagh bei Kaisarie.

Am nächsten verwandt mit *M. solitarius* Mey., aber schon durch die schwarz gezeichneten Fühler, den längeren Schnabel und die ganz helle größere Membranzelle leicht zu unterscheiden. Die zwei Endglieder der Fühler und des Schnabels sowie die Tarsen sind schwarz.

Macrotylus Herrichii Reut. — Zwischen Konia und Kaisarie.

Criocoris sulcicornis Kb. — Illany-Dagh bei Kaisarie.

Sthenarus pollinosus n. sp. — Oblongus (♂) vel oblongo-ovatus (♀), niger, nitidus, supra nigro-pilosulus et praeterea pilis squamiformibus argenteis facile divellendis sat dense vestitus; capite apice pronoti parum (♂) vel vix (♀) latiore, vertice oculo $\frac{2}{3}$, (♂) vel $\frac{5}{6}$ (♀) latiore, margine postico carinato, flavo-testaceo; antennis corpore fere $\frac{1}{3}$ brevioribus, articulo primo toto dimidioque basali articuli secundi nigris, articulis duobus ultimis cum dimidio apicali articuli secundi flavo-testaceis, articulo secundo apicem versus nonnisi levissime incrassato, latitudine capitidis distincte longiore et latitudine postica pronoti $\frac{1}{4}$, (♂) vel $\frac{1}{3}$ (♀) breviore, articulis duobus apicalibus simul sumtis articulo praecedenti longitudine aequalibus, articulo quarto articulo tertio fere dimidio breviore; rostro coxas posticas subsuperante; pronoto basi longitudine sua fere duplo latiore et apice fere aequilato ac longo; hemelytris unicoloribus, corio et cuneo interdum nonnihil fusco-pelluentibus, membrana nigricante, venis concoloribus; pedibus rufo-testaceis, femoribus basi saepe nonnihil nigricantibus, tibiis nigro-spinulosis, apice cum tarsis nigris. ♂ ♀. Long. 4— $4\frac{1}{2}$ mm.

Zwischen Konia und Kaisarie sowie am Illany-Dagh bei Kaisarie.

Ähnlich, aber etwas größer wie *S. carbonarius* Horv., der Hinterrand des Scheitels jedoch deutlich gekielt, Fühler länger, Endhälfte des zweiten Fühlergliedes und Hinterrand des Scheitels lehmgelb, Schenkel und Tibien roströthlich.