

segmentorum connexivi albis; coxis anticis albis, puncto laterali externo mox ante medium apiceque late nigris; femoribus et tibiis anticis nigris, illis annulis tribus angustis et apice ipso, his basi ima et annulis tribus angustis albis; tarsis anticis basi albis, apice nigris; pedibus posterioribus albis, nigro-annulatis. — Long. 5,5 mm.

Château de la Bonde près la Motte d'Aigues (Vaucluse). — Découvert par M. Ch. FAGNIEZ.

Cette espèce diffère des autres *Ploiariola* paléarctiques par la structure de la tête et du pronotum. La tête est moins tuméfiée en dessus avec la partie postoculaire un peu rétrécie vers la base; le pronotum est plus long et assez sensiblement rétréci en avant. Elle est facile à distinguer aussi de *P. vagabunda* L. par les caractères suivants : taille plus faible, antennes et pattes tout à fait glabres, couleur générale plus obscure, pronotum paré de deux bandes longitudinales blanches, connexivum noirâtre maculé de blanc, pterostigma avec 1-2 petites taches noires.

M. Ch. FAGNIEZ m'écrivait sur la première capture de cette espèce : « Pour la chasse des Coléoptères j'ai une grande chambre d'éclosion, dans laquelle je mets, en hiver, des bois d'essences variées. L'an dernier (1910) je n'avais dans cette pièce que du bois de chêne vert (*Quercus ilex*) et de tilleul. C'est dans les premiers jours du juillet que j'ai vu paraître *Ploiariola*, mais vers le milieu du mois et le soir (au coucher du soleil) il y en avait certainement plus de cent sur la vitre, Ne pensant pas avoir affaire à une espèce inédite, je n'en ai malheureusement capturé que six. — D'où venaient ces *Ploiariola*? Pour moi, je crois bien qu'ils sortaient des branches de tilleul, car il y a plus de dix ans que j'ai du chêne dans ma pièce d'élevages et c'était la première fois que j'y mettais du tilleul. »

* *

Je profite de cette occasion pour signaler la capture de *Ploiaria canariensis* Noualh. en Italie, non loin de la frontière française. Cette espèce canarienne se trouve aussi à Madère, mais n'a pas encore été indiquée d'Europe. J'en ai reçu du D^r O. SCHNEIDER un exemplaire pris par lui à San-Remo.

* *

Heterocordylus Benardi, n. sp. — *Oblongus* (♂) *vel oblongovatus* (♀), *niger, opacus, squamulis orichalceis vel albidis facile divellendis sat dense vestitus; capite latitudine basali pronoti paullo plus*