

Pseudamenophis Favareli, n. sp. — *Oblongo-elongatus*, *nitidus*, *olivaceus*, *antennis tarsisque nigro caeruleis*. — Long. 19 mm.

Oblong-allongé, brillant, vert olive avec les antennes et les pattes d'un noir bleu. Prothorax large, presque droit sur les côtés, assez fortement et éparsement ponctué, la ponctuation s'effaçant sur les côtés; élytres pas très longs, un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, courtement rétrécis à l'extrémité, fortement striés, les stries ponctuées de points médiocres, espacés, intervalles convexes, épipleures très larges en avant, rétrécis à l'extrémité vers la suture.

Gabon : Bas Ogoüé (FAVAREL, in coll. Pic).

Très voisin de *P. aeneus* Pic et distinct, à première vue, par les épipleures rétrécis à l'extrémité, tandis qu'ils sont larges chez *aeneus*.

Amenophis (Derilis) instriatus, n. sp. — *Latus*, *subopacus*; *niger*, *capite thoraceque minute et sparse punctatis*; *elytris indistincte striatis*, *minute lineato punctatis*, *intervallis latis*, *deplanatis*. — Long. 23 mm.

Large, presque opaque, entièrement noir, à ponctuation fine et écartée sur l'avant-corps, petite et disposée en rangées sur les élytres qui n'ont pas de stries appréciables avec des intervalles larges et plats, peu ponctués. Prothorax plus large que long et bien plus étroit que les élytres qui sont larges et robustes, courtement rétrécis au sommet; pattes longues, tibias creusés.

Congo français (coll. Pic).

Voisin d'*A. atricolor* Pic dont il est distinct, à première vue, par la forme plus robuste et les élytres non fortement striés.

Description d'un Miride nouveau de Corse [HEM.]

par le Dr G. HORVATH.

Mimocoris formosus, n. sp. — *Niger*, *nitidus*, *supra parce albido-pilosus*; *capite ferrugineo*; *antennis nigris*, *articulo primo (apice ipso excepto) dimidioque basali articuli tertii ferrugineo-testaceis*, *articulo secundo articulo praecedente quintuplo longiore et dimidio apicali sensim incrassato* (♂) *vel clavato* (♀), *articulis duobus ultimis simul sumtis articulo secundo paullo brevioribus*, *articulo tertio articulo quarto 1½-1¾ longiore*; *rostris nigro*, *usque ad apicem coxarum posti-*