

### 3. *Myrmecophyes caucasicus* n. sp.

*Brachypterus*, elongatus, niger, subopacus, glaber; capite basi pronoti dimidio latiore, vertice plano et quam oculo duplo latiore; oculis sessilibus; antennis glabris, articulis duobus basalibus flavo-testaceis, rudimento basali articuli tertii nigro (pars apicalis antennarum deest), articulo primo latitudine verticis  $\frac{1}{5}$  longiore, lineari, gracili, apicem versus setulis 2—3 semierectis brevibus nigris praedito, articulo secundo articulo primo duplo longiore; rostro nigro, fere usque ad apicem coxarum posticarum extenso; pronoto subtransverso, basi longitudine sua vix latiore, prope marginem anticum subtilissime transversim strigoso, versus medium latissimo, lateribus levissime rotundatis; mesonoto (sine scutello) pronoto  $\frac{2}{5}$  brevior, convexusculo, scutello sat discreto, concolore; elytris obsolete rugoso-punctatis, nigris, apice rotundato-truncatis et anguste albo-limbatis limbo hoc albo extus quam intus paullo latiore, angulo apicali interno subrecto, externo rotundato, commissura mesonoto fere  $\frac{1}{5}$  brevior; abdomine subnitido, basi leviter constricto, retrorsum sensim ampliato, in triente apicali latissimo, marginibus lateralibus subrectis; pedibus ferrugineo-testaceis, tibiis anterioribus apice, tibiis posticis totis, tarsisque omnibus nigris, tibiis tenuiter nigro-spinulosis. ♀. Long. 4 mill.

Caucasus!, leg A. KIRITSHENKO. (Mus. Helsingfors.)

*M. monticolae* m. affinis, sed capite, pronoto et mesonoto subopacis, articulo etiam secundo antennarum flavo-testaceo, pronoto minus transverso, mesonoto magis convexo, elytris apice rotundato-truncatis, angulo apicali externo minus fortiter rotundato limboque apicali albo angusta, extus quam intus tantum paullo latiore differt.

### 4. *Myrmecophyes alacer* n. sp.

*Brachypterus*, elongatus, niger, subopacus, glaber; capite basi pronoti fere dimidio (♂) vel  $\frac{1}{3}$  (♀) latiore, vertice plans et quam oculo  $\frac{3}{4}$  latiore; oculis sessilibus; antennis glabris, articulis duobus basalibus ferrugineo-testaceis, articulo secundo basi et apice imis articuloque tertio nigris, articulo primo latitudine verticis  $2\frac{1}{4}$  (♂) vel  $\frac{3}{4}$  (♀) longiore, lineari, gracili, setis nonnullis semierectis nigris obsito, articulo secundo articulo primo  $2\frac{5}{7}$  (♂) vel  $2\frac{5}{6}$  (♀) et quam articulo tertio  $\frac{4}{5}$  (♂) vel  $\frac{1}{3}$  (♀) longiore (articulus quartus deest); rostro apicem coxarum posticarum haud attingente, fusco; pronoto trasverso, basi longitudine sua paullo ( $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{7}$ ) latiore, pone apicem subtilissime transversim strigoso, mox ante medium latissimo, marginibus lateralibus levissime arcuatis; mesonoto (sine scutello) pronoto  $\frac{2}{5}$  brevior, pone medium convexo-declivi, scutello bene discreto, concolore; elytris obsolete punctatis, nigris, apice oblique rotundatis et sat anguste albolimbatis, limbo apicali albo ubique aequae lato, angulo apicali