

дѣ налёта, серебристыми волосками. Хоботокъ очень длинный, достигающій до 4 или 5 сегмента брюшка. Переднеспинка свѣтлозеленоватая, съ легкимъ буроватымъ оттѣнкомъ по бокамъ и по срединной линіи; вдоль переднеспинки проходитъ весьма тонкая черточка, не покрытая пунктиромъ; боковые края листоватые, но не широкіе, впереди значительно суживающіеся; края эти имѣютъ по срединѣ слабую выемку; въ углубленіи шейнаго угла помѣщается овальное пятнышко чернаго цвѣта; задній край переднеспинки имѣетъ передъ щиткомъ пологую, дугообразную выемку. Щитокъ и надкрылья такой же формы и цвѣта какъ у *A. carinatus*; перепонка у ♀ также недоразвитая, но ребра надкрыльевъ не столь выпуклы какъ у *A. carinatus*. Ноги сильныя, бедра всѣхъ паръ, а особенно задней, покрыты съ внутренней стороны правильными рядами бурыхъ пятенъ; голени съ внутренней стороны буроватыя и усажены довольно густой щеткой черныхъ волосковъ. Вся нижняя сторона настькомаго и брюшко—свѣтлозеленоватые. Самецъ мнѣ неизвѣстенъ Дл. 7 — 7½ мм. Сарепта, Ахтубинскія степи, Богдо.

*Calocoris Reicheli* Fieb. Астрахань, изрѣдка на листьяхъ ветлы (*Salix* sp.)

*C. seticornis* Fab. Сарепта.

*C. Henkei* n. sp.

Kopf, Pronotum und Schild bräunlichgrün; Halbdecken und Hinterschenkel röthlichbraun. Oberseite fein gelbbehaart. Pronotum gross punctirt, Schild fein querrunzelig. Ein Fleck im Nacken, Schildspitze und die Buccel des Pronotum braunschwarz. Halbdeckenrand und Cuneus—weisslich, innen bräunlichroth gesäumt