

тень (какъ и на остальныхъ бедрахъ), съ верхней стороны такія же пятна неправильно раскиданы; между ними какъ сверху, такъ и снизу расположены еще пятна краснаго цвѣта. Бедра первыхъ двухъ паръ ногъ и голени свѣтлыя, буроватожелтыя, изъ нихъ послѣднія покрыты черными шипиками. Концы голеней и послѣднихъ суставовъ лапокъ черные. Все насѣкомое покрыто желтоватыми волосками. Дл. 8 мм. Астрахань, въ Августѣ 1875 г. на молочаѣ (*Euphorbia* sp.)

*C. fasciatus* n. sp.

Oberseite bleich bräunlichgelb. Pronotum und Schild fein quengerunzelt. Nacken mit zwei röthlichen Streifen. Fühler—röthlichgelb, Wurzelglied am Grunde—weisslich. Vorderrandkiel des Pronotum schwach. Pronotum vor dem weisslichen Hintersaume mit schwarzem Bande. Schild schwarz, ein eirundlicher Fleck auf dem Schildgrunde bräunlichgelb. Clavus am Grunde und Corium-Ende schwarzbraun, Corium-hinterrand—roth. Cuneus bluthroth, Spitze röthlichbraun. Hauptrippe des Corium am Ende gabelig. Membran licht rauchbraun, rings um die bräunlichrothe Zelle ein breiter heller Schein. Schenkel, Bauch und Brust orange-roth; Seiten der Brust—weisslich. Schienbeine weisslich, am Ende—röthlich; Dorne schwarz. Klauenglied schwärzlich. L. 6—6½ mm. Sa-repta.

Видъ этотъ долженъ стоять рядомъ съ *C. hethierryi*, описаннымъ Фиберомъ изъ Франціи (*Verhandl. der Zool.-Bot. Ges. in Wien*. Bd. XX. 1870 S. 260, n°7.)