

ставовъ. Боковыя части груди бѣловатыя. Бедра ногъ оранжевокрасныя, голени и лапки бѣловатыя съ черными шипами и красноватыми концами у голеней; послѣдній суставъ лапокъ на концѣ черноватый. Дл. 6—6 $\frac{1}{4}$ мм. Сарпта (Христофъ.)

Eroticoris rufescens Burm. Астрахань, изрѣдка.

Orthocephalus bilineatus n. sp.

Ganz schwarz; Oberseite schwarz beborstet und goldgelb beschuppt. Fühler zerstreut langbehaart; Fühlerglied 2 bräunlich, Grund schwarz. Halbdecken schwarz, ein Streif an der Schlussnath—weisslich. Membran bräunlich, schwarz gefleckt. Schienbeine bleich rötlichbraun, aus schwarzen Puncten schwarz bedornt; Schienbeinende und Grund—bräunlich. L. 4 mm. (♂) Sarepta.

Чернаго цвѣта; наружная сторона покрыта черными щетинками и прилегающими золотистыми волосками, въ видѣ чешуекъ. Усики покрыты длинными тонкими волосками чернаго цвѣта, основная половина втораго сустава темнубурая. Надкрылья черныя, просвѣчивающія бурымъ; вдоль всего шва, отдѣляющаго clavus отъ scutum (sutura clavi), идетъ полоска бѣлаго цвѣта. Перепонка буроватая, слабо онализирующая, покрытая черными пятнами неправильной формы. Голени ногъ бѣднаго, красноватобураго цвѣта, основанія ихъ и концы темнѣе; на нихъ расположены длинныя, черныя шипы, при основаніи которыхъ замѣтны темныя пятна. Дл. 4 мм. (♂); самка неизвѣстна. Сарпта (Христофъ.)

Видъ этотъ стоитъ ближе всего къ *O. bivittatus* Fieb.