

O. opacus n. sp.

Körper schwarz, matt, silberweiss beschuppt. Kopf schwarz, Wangenplatten und ein Fleck neben den Augen gelblich. Fühler schwarz, Fühlerglied 2 und 3 roströthlich; Wurzelglied dick, stabförmig, stark beborstet, Glied 2, 3 und 4—dünn fadenförmig, fein langbehaart. Pronotum und Schild sehr fein querrunzelig. Membran schmutzigweiss, fast durchscheinend, Zellrippen braun, Beine schwarz, Schenkelende und Schienbeine roströthlich, Schienbeinende und Fussglieder — schwarz. Hinterschenkel stark, schwarz beborstet und silberweiss behaart. Aeussere Kante der Hinterschienbeine aus schwarzen Punkten schwarz bedornt. Connexivum und Brustseiten—weisslich. L. $3\frac{1}{2}$ mm. (♂)—Halbdecken ohne Membran. L. $2-2\frac{1}{2}$ mm. (♀). Sarepta, Bogdo, Astrakhan.

Чернаго цвѣта, матовый, покрытый серебристыми волосками въ видѣ чешуекъ (другаго рода волосковъ и щетинокъ не имѣеть). Голова чернаго цвѣта; bucculae и круги около глазъ желтоватые; первый суставъ усиковъ толстый, черный, съ сильными стоячими щетинками такого же цвѣта; остальные суставы тонкіе, нитеобразные, съ нѣжными волосками, второй и третій изъ нихъ свѣтлорыжіе. Переднеспинка и щитокъ съ едва замѣтными поперечными струйками. Перепонка грязнобѣлаго цвѣта, полупрозрачная, безъ пятенъ; ребра ея темнобурая, такъ же какъ и клѣтки, образованныя этими ребрами; иногда съ вѣшной стороны клѣтокъ бываетъ темная полоска, идущая вдоль перепонки къ ея заднему краю и постепенно расширяющаяся. Ноги черныя, вер-