

шина бедръ и голени рыжеватая, бедра задней пары сильно утолщены и густо покрыты серебристыми волосками и черными щетинками; концы голеней и лапки черныя. Ряды щетинокъ на задней парѣ голеней помѣщаются только на вѣшной сторонѣ ихъ и при основаніи имѣютъ черныя точки. Брюшко черное, весьма узкая наружная окраина его бѣловатая, равно какъ и окраины частей груди. Дл. $3\frac{1}{2}$ мм. (♂) — Самки этого вида съ укороченными надкрыльями и болѣе толстымъ туловищемъ, во всемъ остальномъ совершенно сходны съ самцами; только задняя пара ногъ у нихъ еще сильнѣе развита. Дл. $2-2\frac{1}{2}$ мм. (♀)

Видъ этотъ нерѣдко попадаетъ подъ Сарептой и Астраханью; но въ очень большомъ количествѣ былъ мною замѣченъ, въ началѣ Мая, въ урочищѣ Харахой, около горы Богдо. Онъ держится обыкновенно на разныхъ видахъ полыни (*Artemisia* sp.)

Psallus notatus Fieb. (*P. tamaricis* Perris; *P. elegans* Iakowl.) Астрахань, во множествѣ на цвѣтахъ *Tamarix* sp.

P. rubricatus n. sp.

Oberseite gelblichroth, dicht behaart; mit bräunlichen Borsten und gelbem Schuppenhaar fleckig bekleidet. Fühler gelblich, Wurzelglied oben hellroth, Glied 3 und 4 braunröthlich. Cuneus und Schild hellroth. Beine röthlichgelb, Schenkelende röthlich, Schienbeindorne bleich bräunlich. Membran bräunlich; Zellrippen rosig
L. $2\frac{1}{2}$ mm. Bogdo (Christoph.)

Все насѣкомое желтоваторозоваго цвѣта; послѣдній цвѣтъ болѣе всего сосредоточенъ на щиткѣ и cuneus.