

глаза ярко карминно-розовые. Вся наружная поверхность густо усеяна волосками двухъ родовъ: длинными, щетинистыми, однако очень нѣжными, буроватаго цвѣта и короткими, прилегающими, въ видѣ чешуекъ блѣдно-золотистаго цвѣта, причеиъ послѣднiе расположены не сплошь, а отдѣльными группами или пятнами. Усики очень длинные, желтоватаго цвѣта, вершина перваго сустава густорозоваго цвѣта, 3 и 4 сустава буроватозолотистые. Ноги розовожелтыя, бедра къ концу краснѣе; голени безъ пятенъ, съ наружной стороны несутъ рядъ щетинокъ свѣтлобурого цвѣта. Лапки розоватыя, почти бурья. Перепонка блѣднобурая, сильно опализирующая; ребра ея розоватыя, а полоска ниже cuneus—свѣтлая. Дл. $2\frac{1}{2}$ мм. Богдо (Христофъ), также Дербентъ (Фаустъ).

Agallaster lanuginosus n. sp.

Oberseite grauweiss, dicht anliegend weissbehaart. Fühler bleich bräunlich, das Wurzelglied und die Grundhälfte des zweiten Gliedes—schwarz. Beine schmutzigweiss, Hinterschenkel und Fussglieder bräunlich, Klauenglied schwarz. An den Schenkelenden 1 schwarz Punkt oberseits. Schienbeine aus schwarzen Punkten schwarz bedornt. Clavus-ende und Cuneus grau-bräunlich; Corium-Rand gelblich. Pronotum vorn und Schild braunschwarz, Schildgrundwinkel orangebräunlich. Stirnschwielle schwarz. Membran bräunlich, Zellrippen und Winkelfleck bis zur Corium-Ecke weisslich. L. $2\frac{1}{2}$ mm. Sa-repta.

Вся наружная поверхность сѣроватобѣлаго цвѣта, густо покрытая длинными бѣлыми волосками съ шелко-