

Fam. **Capsides.**

Lopus affinis n. sp.

Ganz braunschwarz, schwarz behaart. Kopf mit weisslichen Flecken vorn an den Augen; Rand des Corium weiss, Cuneus schwarzbraun. Fühler schwarz, Fühlerglied 1 am Ende und Glied 2 am Grunde bräunlich. Schenkelende und Schienbeine schmutzig braungelb. Corium—Rand weiss behaart. L. 6 mm.

Kurusch (Kaukasus.)

Весь темнобурый; два пятна впереди глазъ и наружный край надкрыльевъ бѣлые. Cuneus бурый, задний край его и конецъ—темнѣе. Голени и концы бедръ грязнаго буроватожелтаго цвѣта. Усики червые, вершина перваго сустава ихъ и основаніе втораго бурые. Наружная сторона покрыта длинными стоячими черными волосками, на боковыхъ краяхъ надкрыльевъ такіе же волоски бѣлаго цвѣта. Дл. 6 мм.

Видъ этотъ очень близокъ съ *L. albomarginatus* Klg., но отличается однообразнымъ бурочернымъ цвѣтомъ головы, переднеспинки, щитка и cuneus.

Курушь, на Кавказѣ (Фаустъ, Христофъ и Беккеръ).

Calocoris rubripes n. sp.

Graugelb, dicht anliegend behaart. Kopf gelb, braun quergestrichelt, Stirnsehiele am Ende bräunlich. Fühlerwurzelglied braunroth, Glied 2 schmutziggelb am Grunde und an der oberen Hälfte—röthlichbraun; Glied 3 am Grunde weisslich. Pronotum grobpunctirt, vor dem weissen Hintersaume mit braunem Bande. Pro-