

Видъ этотъ долженъ быть поставленъ рядомъ съ *L. limbatus* Fall., съ которымъ его сближаютъ нѣкоторые признаки, напр. пятнистость голеней, черные шипки расположенные на нихъ и проч.

Собраны въ большомъ количествѣ Dr. Дыбовскимъ на Уссури, подъ 48° с. ш.

*Psallus rubronotatus* n. sp.

Weissgelblich; Kopf und Pronotum glänzend, kahl, Halbedecken und Abdomen matt, dicht goldgelb feinbehaart. Kopf im Nacken roth quergestrichelt. Pronotum-Buckel und Seitenstreif rothgesprenkelt; Schulterecke und zwei Hinterrandflecken schwärzlich. Schild röthlich mit weissem Callus in jedem Winkel und mit gelber durchlaufender Mittellinie. Die breite Querbinde an der Hinterhälfte des Corium braun. Cuneus weisslich, ohne Flecken. Fühler bräunlichgelb, Glied 1 und 2 am Grunde—schwarz, Fühlerwurzel am Ende weisslich, Glied 3 und 4 bräunlich. Brust und Bauchgrund schwarz, Bauchrand rosenroth. Beine weisslich, schwarz-punctirt, Schienbeindorne schwarz. L. 4 mm. Sarepta.

Голова и переднеспинка блестящія, безволосыя, надкрылья и брюшко матовыя, довольно густо покрытыя очень нѣжными, прилегающими, желтоватыми волосками. Голова и переднеспинка бѣловатыя, также какъ надкрылья и брюшко. Тулус ограниченъ красными полосками; на головѣ между глазами нѣсколько поперечныхъ красныхъ черточекъ образуютъ рисунокъ напоминающій букву O. Callus переднеспинки густо усыянъ красными