

точками, двѣ полоски идущія вдоль боковъ передне-спинки также образованы изъ подобныхъ точекъ. Плечевые углы и два небольшихъ пятна на заднемъ краю передне-спинки передъ щиткомъ черноватые. Щитокъ красноватый, въ основныхъ углахъ его два большихъ голыхъ возвышенія бѣловатаго цвѣта, ниже ихъ пара вдавленныхъ черныхъ пятнышекъ; вдоль щитка замѣтна желтоватая полоска. Scutum, бывающій иногда съ розоватымъ оттѣнкомъ, на концѣ имѣетъ широкую, бурюю поперечную полосу, которая захватываетъ и конецъ clavus. Sineus бѣловатый, задняя треть его бурая. Перепонка блѣдная, дымчато-бурая, къ концу постепенно темнѣющая, ребра ея клѣтокъ бѣловатыя, а самыя клѣтки безъ пятенъ. Усики рыжеватые, а основанія перваго и втораго суставовъ черныя, вершина перваго сустава бѣловатая, третій и четвертый суставы буроватые. Части груди и основаніе брюшка снизу черныя, широкіе боковые края брюшка розовые. Ноги бѣловатыя, бедра и голени покрыты черными, довольно крупными точками; на концахъ бедръ и на голеняхъ шипики черные. Дл. 4 мм. Сарента (Беккеръ.)

Видъ этотъ напоминаетъ *P. punctulatus* Fieb. et Pul., который также разрисованъ красными линиями, точками и пятнами, но у этого вида расположеніе рисунка совершенно иное и кромѣ того много отличій въ цвѣтъ другихъ частей туловища.

*Auchenocrepis Reuteri* n. sp.

Schwarz und weiss, glänzend, sehr fein behaart, Kopf braunroth, Tylus schwarz. Fühler schwarz, fein weisslichbehaart, Glied 3 und 4 rothgelb. Schild, Clavus, Kopf unten, Xyphus, Hüften, Bruststücke, Bauchgrund und Schen-