

# НОВЫЯ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЯ

## HEMIPTERA HETEROPTERA

РУССКОЙ ФАУНЫ.

*B. Яковлева.*

---

Fam. **Pentatomides**

Subfam. **SCUTELLERIDAE.**

---

**Dybowskyla** n. gen.

Körper eirundlich, beiderseits hochgewölbt, kahl. Jochstücke des Kopfes lanzettlich, aneinanderliegend. Augen sehr klein. Kopf vorn etwas gekrümmmt; Kopfrand kielförmig. Schnabel an das dritte Hüftpaar reichend. Wangenplatten gerade, gleichbreit, so lang als der Kopf. Fühlerglieder dünn, Glied 1 und 2 zusammen nicht an das Kopfende reichend; Glied 2 länger als 1 und so lang als 3; Glied 4 sehr kurz, so lang als Glied 1; Endglied spindelig, so lang als Glied 3 und 4 zusammen. Schild breit, den ganzen Rücken deckend, hinter dem Buckel abgedacht; Grund gewölbt.

Туловище укороченоovalной формы, выпуклое какъ съ верхней, такъ и съ нижней стороны. Голова трехугольная, узкая, длинная; конецъ носа очень короткій, сколовые отростки весьма длинные, вытянутые, боковой край головы передъ глазами сильно вырѣзанъ, такъ что острые бугорки сидящіе у основания усиковъ хорошо видны если глядѣть сверху. Весь боковой край головы окруженъ возвышеннымъ каптикомъ; конецъ сколовыхъ отростковъ нѣсколько загнутъ книзу. Глаза очень маленькие. Виссулаe прямолинейные, сильные, во всю длину головы. Усики тонкіе, нѣжные, особенно 2 и 4 суставы; основной суставъ очень короткій и вмѣстѣ со вторымъ едва достигаетъ конца головы; второй пѣсколько длиннѣе первого и равенъ по длине третьему; четвертый тонкій и очень короткій, равный первому; пятый толще прочихъ, веретенообразный, равный по длине двумъ предпослѣднимъ суставамъ—взятымъ вмѣстѣ. Хоботокъ тонкій, достигающій до третьей пары ногъ. Передній край переднегруди безъ отростковъ. Переднеспинка спереди суженная, кзади довольно выпуклая, съ широкоокруглыми боковыми углами, не шире брюшка; передній и боковые края сильно вырѣзаны; передній край гораздо шире головы, такъ что довольно острые, шейные углы далеко отстоятъ отъ края глазъ. Въ передней части переднеспинки находятся три возвышенія образующихъ поперечный рядъ; одно изъ нихъ приходится по средней линіи, а два лежать по бокамъ, ближе къ шейнымъ угламъ; эти возвышенія отдѣлены другъ отъ друга довольно глубокими впадинами; вдоль переднеспинки, по средней линіи ея, идетъ очень нѣжное ребро, которое переходитъ на щитокъ, не доходя до его конца. Щитокъ широкій, достигающій конца брюшка, боковые края слабо округлые.

лленные, изъ подъ нихъ видны узкие края corium и connexivum. Передняя часть щитка отдѣлена бороздкой, образующей почти правильный полукругъ; на концахъ этой бороздки, у основныхъ угловъ щитка, находится глубокая впадина, къ внутреннему краю которой при-мыкаетъ голое возвышение (callus); средина щитка выпуклая, задняя половина его спускается довольно круто къ концу, въ видѣ крыши. Брюшко выпуклое. Ноги короткія, довольно толстые. (Болѣе подробнаго описанія— частей груди, крыльевъ и пр. дать невозможно, потому что въ моемъ распоряженіи находился только одинъ экземпляръ.)

По формѣ головы родъ этотъ напоминаетъ р. *Ancyrosoma*, а по образованію щитка родъ *Psacasta*.

**D. ussurensis n. sp.**

Schwarzbraun, dicht grobpunktiert. Fühler schwarzbraun, Glied 2, 3 und 4 am Ende röthlich. Kopf, Vordertheil des Pronotum, Bauchmitte und Schenkel fast schwarz. Schild mit einzelnen braungelben Knötchen. Pronotum und Schild mit feiner braungelblicher durchlaufen der Mittellinie. Connexivum röthlichbraun mit schwarzen Winkelflecken. Schenkelende, Schienbeine und Füsse gelbbraun, Spiracula schwarz. L. 5 mm. Ussuri.

Весь темнобурый, сильно и часто пунктированный, безволосый. Голова, углублена въ передней части переднеспинки, средина брюшка и бедра почти черного цвета; узкая продольная линия на переднеспинкѣ и щиткѣ, callus, множество мелкихъ бугорковъ на щиткѣ и на бокахъ груди, а также двѣ широкихъ полоски по

бокамъ брюшка изъ нихъ одна — на краю — буровато-желтаго цвѣта. Connexivum красноватобурый съ черными пятнами въ основныхъ половинахъ сегментовъ; концы бедръ, голени и особенно лапки буроваторыжие. Дыхальца черныя. Усики темнобурые, концы втораго, третьаго и четвертаго суставовъ — красноватые. Длина 5 мм., ширина около 4 мм.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

### Subfam. **Pentatomidae.**

#### **Neottiglossa metallica n. sp.**

Unterseite, Kopf, Vordertheil des Pronotum und Schild am Grunde metallisch schwarzvioletti. Membran hell, fast durchsichtig, Kopf verlängert, nicht gekrümmmt. L. 5½ mm. Ussuri.

Видъ близкій къ *N. inflexa* Wolff и *N. obscura* Sahlb. Вся нижняя сторона тулowiща, голова, передняя часть переднеспинки и широкое основание щитка чернаго цвѣта съ металлическимъ фиолетовымъ блескомъ. Голова вытянутая, почти прямая; пятно на затылкѣ, боковые края переднеспинки, два небольшихъ пятна въ передней ея части, продольная линія по ея срединѣ, большія вытянутыя внизъ callus въ углахъ щитка, основной край надкрыльевъ и узкія окраины брюшка снизу — гладкія, бѣлаго цвѣта. Перепонка полупрозрачная, безцвѣтная. Конецъ согium тупоокругленный и приходится на одной линіи съ концемъ щитка. Первый суставъ усиковъ рыжий, (остальныхъ въ моемъ экземпляре недостаетъ.) Форма щитка и ноги — какъ у *N. inflexa*. Дл. 5½ мм.

Отъ другихъ близкихъ видовъ, съ первого взгляда, отличается формою головы почти вытянутой прямо, тог-

да какъ вообще у рода *Neottiglossa* передняя часть головы круто загибается книзу и сильнымъ развитіемъ металлическаго блеска.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. В. Дыбовскій.)

*Homalogonia* n. gen.

Körper breitoval, kahl, grobpunctirt, Kopf breit, Kopfrand gerade, Stirnschwiele eingeschlossen. Wangenplatten liniensförmig, vorn spitzeckig. Schnabel schlankgliederig, an das Ende der Hinterbrust lang; Wurzelglied viel kürzer als der Kopf. Fühlerglieder schlank, lang; Wurzelglied dünn, nicht an den Kopf reichend, Glied 2 doppelt so lang als 1, Glied 3 und 4 gleichlang, jedes fast um  $\frac{1}{3}$  länger als das vorherige. Endglied dünn, spindelig, länger als 4. Pronotum breit, Schulterecke stumpf, stark zu gerundet. Mittelkiel der Mittelbrust an das Ende des Mittelxyphus reichend. Bauchschiene 2 mit stumpfem Höcker am Grunde.

Родъ этотъ долженъ стоять около р. *Carpocoris* Kti. Туловище широкоовальное, гладкое, покрытое сверху частымъ, сильнымъ пунктиромъ. Голова плоская, широкая; ширина ея въ затылкѣ значительно короче длины; боковые края почти прямые, слегка приподнятые кверху; скапулевые отростки плоскоокруглые, длинные, длиннѣе конца носа, который остается открытымъ. Висцулæ узкіе, линейные, занимающіе двѣ трети головы; спереди они оканчиваются довольно сильнымъ зубцомъ, а сзади незамѣтно уничтожаются. Хоботокъ тонкій, достигаетъ почти конца заднегруди; первый суставъ его гораздо короче головы, такой же длины какъ и висци-

lae, второй — самый длинный. Усики тонкие и очень длинные, гораздо длиннее головы и переднеспинки взятыхъ вмѣстѣ; первый суставъ ихъ тонкій, короткій, недостающій конца головы, второй вдвое его длиннѣе, третій и четвертый равны между собою и каждый изъ нихъ на одну треть длиннѣе втораго; послѣдній суставъ тонкій, веретенообразный, длиннѣе всѣхъ прочихъ и втрое длиннѣе перваго. Форма головы и хоботка почти такая же какъ у *Carpocoris*, но строеніе *bucculae* и особенно относительная длина суставовъ усиковъ совершенно иная. *Xyphus* переднегруди глубоко вдавленный; вдавленіе это имѣеть форму кольевидную и окружено высокимъ кантомъ; конецъ его прямо обрѣзанъ; среднегрудь по срединѣ вдавлена какъ у *Carpocoris*, вдоль углубленія идетъ ребро, которое достигаетъ до конца широкаго, прямообрѣзанаго и короткаго *xyphus*, тогда какъ у *Carpocoris* это ребро на *xyphus* среднегруди не переходитъ и самый *xyphus* у этого рода имѣеть форму болѣе удлиненную и узкую. Переднеспинка короткая, но широкая; передній край ея глубоко выемчатый, задній передъ щиткомъ прямой, затѣмъ исподволь заворачивается кпереди и образуетъ весьма широко округленные, плоскіе, нѣсколько приподнятые кверху плечевые углы; боковые края, вслѣдствіе выдавшихся плечевыхъ лопастей — глубоко выемчатые и около шейнаго угла сильно зазубрены. Щитокъ, падкрылья и ноги — какъ у *Carpocoris*. Перепонка съ 8 невѣтвящимися ребрами. Второе брюшное кольцо снизу съ тупымъ бугоркомъ по срединѣ.

*H. maculata* n. sp.

Gelblichgrau, oder bleich röthlichgrau, schwarz  
punctirt. Unterseite blassgelblich, farblos punc-

tirt. Schulterecke schwarz, Schild ganz punc-tirt und schwarzgefleckt. Membran bleich bräunlich, mit zerstreuten schwarzen Flecken zwischen den Rippen. Fühler braunroth, Wurzeglied röthlichgelb, schwarzpunctirt, Glied 4 und 5 schwarz, am Grunde röthlich. Beine graugelblich, schwarzpunctirt-gestreift, L. 13 mm.

Ussuri.

Все туловище гладкое, безволосое, желтоватосъраго цвѣта, иногда съ слабымъ буроватокраснымъ оттѣнкомъ. Частый и довольно грубый пунктиръ покрываетъ всю наружную сторону; точки пунктира черного цвѣта, снизу туловище свѣтловатое и пунктиръ безцвѣтный; брюшко снизу покрыто кромъ того очень мелкими струйками, лишь продольная средняя линія почти гладкая. Широкіе въ видѣ языка плечевые отростки кажутся почти черными, отъ очень скученного пунктира. Въ передней части передней спинки замѣтно четыре небольшихъ гладкихъ возвышенности, которые лежать въ одномъ поперечномъ ряду. Щитокъ пунктируемъ до самаго конца и весь одноцвѣтный, только у основанія его и по срединѣ замѣтно нѣсколько темныхъ парныхъ пятенъ, происходящихъ отъ большей скученности пунктира. На надкрыльяхъ множество свѣтлыхъ возвышенныхъ гладкихъ мѣсть. Перепонка свѣтлобурая, ребра частію того же цвѣта, иногда же темнѣе; вся она покрыта кругловатыми пятнами бураго цвѣта. Усики буроватокрасные, первый суставъ рыжій, покрытый чернымъ крупнымъ пунктиромъ; четвертый и пятый суставы черного цвѣта, по основанія ихъ на одну треть красноватыя. Ноги рыжеватосърыя, покрытыя черными

пятнами и точками, особенно бедра, где они расположены рядами больше или меньше правильными. Последний сустав лапок на концах темнобурый, также как и концы когтей. Connexivum почти черноватый, покрытый весьма сильным и густым пунктиром; по средине каждого сегмента больше светлая полоса. Наружный край брюшка снизу окаймлен очень узкой оторочкой черного цвета. Дыхальца светлые, но вблизи их с внутренней стороны лежать по небольшому черному пятну круглой формы. Иногда посредине брюшка находится несколько очень редко раскиданных черных точек. Переоценка несколько выдается над брюшком. Дл. 13 мм., ширина между плечевыми углами—8—8½ мм., ширина перед концом щитка—7—7½ мм.

Уссури подъ 48° с. ш. и по берегам Японского моря подъ 43° с. ш. Судя по количеству собранных Dr. Дыбовским экземпляров, видъ этот тамъ не редокъ.

*Stromatocoris* n. gen.

Körper eiförmig, kahl. Kopf viel kürzer als zwischen den Augen breit, vorn fast gestutzt. Stirnchwiele durchlaufend. Kopfrand vor den Augen tief, ausgeschnitten. Augen gross, halbkugelig. Pronotumseiten gerade, Schulterecke stumpf. Schnabel schlankgliederig, Wurzelglied kürzer als der Kopf; Wangenplatten linienförmig, kurz, vorn spitzig. Fühlerglieder schlank, Glied 1 das kürzeste, mit dem Ende der Stirnchwiele gleich, Glied 2 fast 1½, mal länger als 1, Glied 3 länger als 2 und so lang als 4; Endglied länger als 4, beide spindelig. Mittelbrust 2 mit einem Mittelkiel. Bauchschiene 2 mit vorstehendem Spiess.

Роль эта отор должна стоять рядомъ съ р. *Piezodorus* къ которому очень близокъ, отличаясь главнымъ образомъ строенiemъ и формою головы и среднегруди.

Туловище продолговатоovalное или овальное, безволосое. Голова еще короче чѣмъ у р. *Piezodorus*, такъ что ширина ея въ затылкѣ взятая вмѣстѣ съ глазами значительно превышаетъ длину. Конецъ носа открытый, оканчивающійся на одной линіи съ склеровыми отростками; эти послѣдніе широкіе, пологіе, округленные съ боковъ и передъ глазами сильно вырѣзанные, спереди голова почти прямо обрѣзана. Переднеспинка, щитокъ, надкрылья и ноги—такой же формы, какъ у рода *Piezodorus*, только на шейныхъ углахъ переднеспинки помѣщаются болѣе сильные зубцы. Хоботокъ достигаетъ половины заднегруди; суставы его очень тонкіе, изъ нихъ первый гораздо короче головы. Висцулæ линейные, короткіе, занимающіе только двѣ трети головы, кзади они округлены, напереди образуютъ небольшой зубчикъ. Усики довольно тонкіе, первый суставъ ихъ очень короткій, едва достигающій конца головы, толще прочихъ, второй въ полтора раза его длиннѣе, третій и четвертый суставы равной длины, каждый изъ нихъ на  $\frac{1}{4}$  часть длиннѣе втораго; пятый вѣсколько длиннѣе четвертаго; второй и третій суставы тонкіе, къ вершинѣ едва расширяющіеся, четвертый и пятый—толстые, веретенообразной формы. Вдоль среднегруди проходитъ тонкое, невысокое ребро. Второй сегментъ брюшка вооруженъ короткимъ, но сильнымъ зубцомъ, обращеннымъ остreeемъ кпереди, конецъ котораго достигаетъ до задняго края среднегруди.

*Stamoenus* n. sp.

Körper länglichoval, graubraun, theils bronsartig glänzend, grobpubertirt. Fühler schwarz,

Wurzelglied und Glied 3 oben-röthlich gelb, (Glied 4 und 5.... fehlt). Kopf, Vordertheil und Seitenrand des Pronotum kupferroth. Rand des Pronotum kantig, orangegelb. Pronotum und Schild mit feiner gelber durchlaufender Mittellinie. Schild orangegelb, am Grunde schwarz metallisch schimmernd, Schildspitze glatt, weiss; vor der Spitze zwei schwarze Querrandflecke. Die kallosen Knoten im Schildgrundwinkel—orangegegelb. Rücken und Connexivum schwarz, mit grossem Mittelfleck auf jedem Schnittstücke. Unterseite orangegegelb, dicht punctirt. Beine schmutziggelb, Schenkelende schwarzpunctirt und gestreift. L. 11 mm.

Ussuri.

Туловище продолговатоовальное, съроватобурого цвѣта, мѣстами съ сильнымъ металлическимъ отливомъ. Голова грубо пунктированная, вся металлически красноватозеленая, только конецъ носа и узkie боковые окраины ея свѣтло желтаго цвѣта. Снизу голова оправжево-желтаго цвѣта, лишь скловыя части впереди сплошь металлически зеленые; сильные, но рѣдкія точки пунктира покрывающаго голову снизу имѣютъ металлическій отливъ. Переднеспинка съ боковыми краями нѣсколько приподнятymi кверху; передній и боковые края ея въ видѣ узкаго гладкаго кантика—оранжево желтаго цвѣта; такого жецвѣта гладкая продольная полоска, весьма неправильной формы, замѣчается въ передней части переднеспинки. Вся переднеспинка грубо пунктирована; впереди точки сосредоточены чаще, а назади они гораздо рѣже и образуютъ короткія, поперечныя морщинки; вдоль переднаго и боковыхъ краевъ ея лежитъ довольно широкая полоса металлическаго мѣдно красного цвѣта, остальная

часть съроватобурая, мѣстами съ оранжевымъ оттѣнкомъ. Точки пунктира черныя съ слабымъ металлическимъ отливомъ; кроме того нѣкоторые ряды точекъ оттѣнены буроватымъ цвѣтомъ. Щитокъ желтоватооранжевый, конецъ его довольно узкій и закругленный, совершенно гладкій, блестящаго бѣлого цвѣта; передняя часть щитка, равно какъ и поперечная, широкая полоса передъ бѣлымъ остремъ—черного цвѣта, съ сильнымъ металлическимъ блескомъ. У основанія щитка, а именно въ углахъ его и по срединѣ находятся гладкія возвышенія неправильной формы—оранжевожелтаго цвѣта; нѣсколько такихъ же возвышений раскидано и по всему черному основанію щитка; вдоль его проходитъ болѣе или менѣе замѣтная средняя полоска оранжеваго цвѣта, которая раздѣляетъ пополамъ черную поперечную полосу, лежащую передъ бѣлымъ концомъ щитка; средняя широкая часть щитка такого же цвѣта и также пунктирована, какъ задняя половина переднеспинки. Надкрылья съроватобурого цвѣта, сплошь покрытыя грубымъ чернымъ пунктиромъ; иногда внутренній уголь надкрыльевъ бываетъ совершенно бурого цвѣта; ребра гладкія, свѣтлые. Перепонка значительно длиннѣе брюшка—свѣтлая, прозрачная, съ рѣзкимъ бурымъ пятномъ или полоской на наружномъ краѣ, передъ концомъ. Брюшко сверху черного цвѣта, connexivum выдающійся изъ-подъ надкрыльевъ, черного же цвѣта; по срединѣ каждого сегмента проходитъ широкая, оранжевожелтая полоса. Нижняя сторона туловища желтоватооранжевая, сильно пунктированная, особенно на брюшкѣ. Шейные углы переднегруди, мѣднокраснаго металлическаго цвѣта; на брюшкѣ пунктиръ черный съ металлическимъ отливомъ; *Xyphus* переднегруди средняя часть среднегруди и заднегруди, а также дыхальца—черного цвѣта.

Средняя продольная линія брюшка — гладкая, не пунктированная; боковой край брюшка снизу имѣть по черному пятнышку въ переднемъ и заднемъ углахъ сегментовъ. Ноги грязно желтоватыя, вершина бедръ покрыта сильными черными точками и кромъ того на каждомъ бедрѣ, на вѣнчайшей его сторонѣ, проходить короткая черная полоска; голени у основания и къ концу, также какъ и лапки, бурочерного цвѣта; второй суставъ лапокъ и основаніе первого — рыжаго цвѣта; концы когтей черные. Первые два сустава хоботка рыжіе, остальные — бурочерного цвѣта. Усики черные (четвертаго и пятаго суставовъ у моихъ экземпляровъ недостаеть); верхняя сторона основнаго сустава и верхняя часть третьяго-рыжеватаго цвѣта. Усики и хоботокъ покрыты очень короткими свѣтлорусыми волосками, ноги — особенно нижняя сторона бедръ и внутренняя сторона голеней — длинными, такого же цвѣта волосками. Волоски на бедрахъ снизу расположены рѣдко, прямостоячіе, имѣющіе характеръ щетинокъ. Брюшко покрыто очень рѣдкими, тонкими волосками, едва замѣтными, но длинными. Зубцы на шейныхъ углахъ переднеспинки острые. Длина туловища безъ перепонки  $9\frac{1}{2}$  мм., съ перепонкою до 11 мм.; ширина между плечевыми углами 5 мм., ширина брюшка, передъ концомъ щитка —  $5\frac{1}{2}$  мм.

Уссури, подъ  $48^{\circ}$  с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

*S. musivus* n. sp.

Körper breitoval, grobpunctirt. Kopf schwarz, Rand schmal, orangegelb. Fühler schwarz, Glied 2 ganz, Glied 3 am Grunde und Ende und Grundhälfte des 4 Gliedes — röthlichgelb. Prono-

tum hinten und Halbdecken braunröhlich; Vordertheil des Pronotum und Schild weisslich, oder gelblich. Vier Querflecken auf dem Pronotum, zwei Flecke am Schulterecke—schwarz. Schildspitze—breit weissgelblich; vor der Spitze zwei schwarze Randflecke, Grundwinkel mit schwarzem Fleck; vor der Schildmitte ein schwarzer Fleck. Rücken schwarz. Unterseite bleich graugelb, Bauch mit schwärzlichem fleckenweise punctirten Streifen. Beine schmutziggelb, Schenkelende fast ganz schwarz. L. 9 mm.  
Ussuri.

Туловище короткое, широкоовальное, безволосое, сильно пунктированное и неимѣющее металлическаго блеска, кромѣ весьма слабаго отлива на задней части головы и въ углубленіяхъ переднеспинки около головы. Задняя часть переднеспинки и надкрыльевъ буровато-краснаго цвѣта, иногда очень густаго, иногда же съ болѣе свѣтлымъ сѣроватымъ оттѣнкомъ; передняя половина переднеспинки и щитокъ то очевь свѣтлого, почти бѣловатаго цвѣта, тѣ переходять въ желтоватые оттѣнки, до яркооранжеваго. Эти части украшены разнообразными симметрическими расположеными черными пятнами. Голова чернаго цвѣта, конецъ носа, узкія боковые окраины головы и нѣсколько мелкихъ гладкихъ возвышений, особенно на скуловыхъ лопастяхъ—свѣтло-желтаго или оранжеваго цвѣта. Первые три сустава хоботка свѣтло-желтоватые, изъ нихъ третій нѣсколько темнѣе, а послѣдній черноватобурый. Усики черные, второй суставъ, основаніе и вершина третьаго и широкое основаніе четвертаго—рыжаго цвѣта; иногда рыжая полоска замѣтна и на верхней сторонѣ основнаго сустава. Изрѣдка усики бываютъ почти сплошь черные,

кромъ основанія и вершины втораго и основанія четвертаго суставовъ. Зубцы на шейныхъ углахъ переднеспинки тупые, иногда довольно широкіе и округленные, иногда же заостренные, причемъ острее обращено нѣсколько кзади. Передній и боковые края переднеспинки гладкіе, въ видѣ свѣтлого канта; на плечевомъ углѣ по два черныхъ пятна; поперекъ переднеспинки, отдѣляя заднюю красную часть отъ передней — свѣтлой, идетъ рядъ черныхъ пятенъ, изъ которыхъ четыре довольно крупныя и нѣсколько мелкихъ (послѣднихъ иногда и не бываетъ); въ переднихъ углахъ лежать большія по-перечныя, извилистыя полоски, неимѣющія пунктира, также чернаго цвѣта, иногда съ слабымъ металлическимъ фиолетовымъ отливомъ. Конецъ щитка ширококо-округленный, гладкій или бѣлаго цвѣта, или оранжеваго цвѣта; передъ концомъ по бокамъ щитка расположены два черныхъ пятна (какъ у многихъ видовъ *Strachia*); въ основныхъ углахъ щитка помѣщается до трехъ черныхъ пятенъ, неправильной формы, окружающихъ большое гладкое возвышеніе бѣловатожелтаго цвѣта; въ передней части щитка, по срединѣ, нѣсколько отступая отъ основанія лежитъ круглое черное пятно, раздѣленное пополамъ срединою продольною узкою полоскою. Надкрылья одноцвѣтныя, грубѣе пунктированныя чѣмъ остальная части туловища; иногда во внутреннемъ углу согium находится большое темное пятно; ребра гладкія; внутреннай уголъ согium, какъ у этого вида, такъ и у *S. atoepinus*, сильно вдавленъ. Перепонка длиннѣе брюшка, свѣтлая, полупрозрачная, ребра ея у основанія и самое основаніе буроватыя. Брюшко черное, connexivum почти такой же какъ у предыдущаго вида. Голова снизу, какъ и все туловище, свѣтлая, сѣроватожелтая, иногда почти бѣлая. На брюшкѣ точки пунктира сли-

ваются въ черныя пятна неправильной формы, которые образуютъ до шести продольныхъ рядовъ. Дыхальца черныя; средняя линія брюшка гладкая, свѣтлая. Переднегрудь неимѣеть черныхъ пятенъ. Xyphus, среднегрудь и заднегрудь посрединѣ матовочернаго цвѣта; ребро вдоль среднегруди частію черное, частію свѣтлое. Ноги такого же цвѣта, какъ и у предыдущаго вида, только черный цвѣтъ получиль здѣсь болѣе сильное развитіе; такъ, концы бедръ, особенно задней пары, почти совершенно черные. Волоски на усикахъ, ногахъ и брюшкѣ такие же какъ и у *S. amoenus*. Длина безъ перепонки — 8 мм., съ перепонкой —  $8\frac{1}{2}$  — 9 мм.; ширина тулowiща 5 мм.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

*Renardia* n. gen.

Körper oval, kahl. Kopf gross, lÄnglich, wenig geneigt. Wangenplatten lineal, vorn spitzkeckig. Schnabel schlankgliederig, an dem Ende der Hinterbrust lang. Fühlerglieder schlank, Wurzelglied kürzer als der Kopf, Glied 2 doppelt so lang als Wurzelglied, Glied 3 fast nochmal so lang als 2; Glied 3, 4 und 5 einander gleichlang. Schulterecke des Pronotum vorwärts gerichtet, spitz. Pronotum - Seiten bogig ausgeschnitten, kleinzahnig. Schild  $\frac{3}{4}$  des Rückens lang, hinter der Mitte verschmäleret, Ende ziemlich spitz. Membran mit acht bis neun ablaufenden Rippen. Vorderbrust vorn kantig. Vorderxyphus rinnenförmig, hinten verengt. Mittelbrust mit einem Mittelkiel. Bauchmitte kantig erhoben; Bauchschiene 2 mit vorstehendem Spiess. Beine unbewehrt, Fussglieder stark.

Родъ этотъ долженъ быть поставленъ рядомъ съ р.  
*Rhapigaster*; онъ принадлежитъ къ той группѣ, пред-  
ставители которой имѣютъ на второмъ брюшномъ коль-  
цѣ снизу — большой шипъ, который у *Renardia* дости-  
гаетъ до половины среднегруди.

Голова большая, плоская, едва наклонная книзу; ши-  
рина ея въ затылкѣ значительно менѣе длины; *tylus* ко-  
роткій, закрытый скелетными отростками. Переднеспинка  
почти полуулунной формы, именно плечевые части имѣ-  
ютъ сильно развитые плоскіе отростки, которые пра-  
вильно загибаются кпереди, въ видѣ роговъ луны; бо-  
ковой край отъ головы до остряя плечеваго отростка у-  
саженъ довольно сильными зубчиками и образуетъ по-  
луулунную вырѣзку. Плечевые углы сзади почти прямые  
и также по краямъ усажены рѣдкими зубчиками. Пе-  
редній край переднеспинки глубоко вырѣзанъ, состав-  
ляя влагалище для головы; задній край передъ щит-  
комъ — прямой. Щитокъ длинный, довольно узкій; ко-  
нецъ согиум удлиняется значительно далѣе пріострен-  
наго конца щитка. Перепонка мелко морщинистая, вы-  
дается надъ брюшкомъ и имѣеть отъ восьми до девяти  
реберъ. *Bucculae* узкіе, липейные, впереди оканчиваю-  
щіеся сильнымъ прямымъ зубцомъ. Тонкосуставчатый  
хоботокъ почти достигаетъ до брюшка; первый суставъ  
его короткій, гораздо короче головы и равенъ по длини  
четвертому; второй почти въ полтора раза длиннѣе пер-  
ваго и равенъ по длини третьему. Первый суставъ уси-  
ковъ очень короткій, далеко не достигающій до конца  
головы, второй суставъ на половину длиннѣе первого,  
третій почти вдвое длиннѣе втораго и равенъ по длини  
четвертому и пятому въ отдаленности. Вообще усики  
тонкіе и нѣжные. Переднегрудь спереди оторочена уз-  
кимъ кантомъ; *xiphus* углубленный, конецъ его заост-

рень; вдоль среднегруди проходитъ довольно высокое ребро. Connexivum выдается изъ подъ надкрыльевъ. Вдоль брюшка идетъ сильное, высокое ребро, которое переходитъ на второмъ брюшномъ кольцѣ въ длины острый шипъ. Ноги такой же формы какъ у *Rhipigaster*; лапки сильные, первый суставъ ихъ большой, равный по величинѣ третьюму, второй вчетверо короче каждого изъ нихъ. Когти большие, съ сильными отростками (*aroliae* у основанія \*).

*R. decempunktata* Motsch. *Bullet. des Natur. de Moscou* 1859, IV, p. 501,—*Tropicoris 10-punctata* Motsch.

Весь блѣднобуроватозеленый, почти одноцвѣтный, покрытый довольно пѣжнымъ черноватымъ пунктиромъ. Щитокъ, Connexivum и ноги — блѣднобуроваты ржіе; кончикъ щитка блѣдоватый, гладкій, на ногахъ также нѣть точекъ. Первые три сустава усиковъ и основаніе четвертаго ржіе, остальная же часть четвертаго и пятый суставъ — чернаго цвѣта. Поперекъ переднеспинки расположены въ одинъ рядъ четыре небольшихъ черныхъ пятна, четыре такихъ же пятна помѣщаются попарно на щиткѣ, кроме того въ основныхъ углахъ послѣдняго находится по одному углубленному черному же пятнышку (о которомъ Мочульскій не упоминаетъ въ своей краткой діагнозѣ). Одно черное же пятно находится почти посерединѣ сорium, съ внутренней стороны главнаго ребра, далеко не достигающаго мембранальнаго шва и оканчивающагося голымъ плоскимъ бугромъ, который приходится какъ разъ сзади чернаго пятна. Боковой край надкрыльевъ у основанія голый. Connexi-

---

\* Родъ этотъ названъ мною въ честь вице-президента Московскаго Общества Испытателей Природы К. И. Ренара.

vum безъ пятенъ, но часто пунктированъ; пунктиръ, какъ и на всей наружной поверхности,—чернаго цвѣта. Брюшко сверху блѣднообуроватое. Туловище снизу очень блѣднаго желтоватаго цвѣта съ безцвѣтнымъ пунктиромъ; между глубокими точками на брюшкѣ множество тонкихъ волнистыхъ морщинокъ и струекъ. Верхняя сторона бугорка поддерживающаго усики имѣеть сильную черную полоску. Съ каждой стороны груди находится по четыре черныхъ пятна; дыхальца также чернаго цвѣта. Конецъ брюшнаго острея, концы голеней и лапки буроватыя, концы когтей чернаго цвѣта. Дл. 20—21 мм.; ширина туловища между плечевыми углами 11 мм.

Уссури и берегъ Японскаго моря подъ 43° с. ш. (Dr. Дыбовскій); Амуръ и Шилка (Мочульскій.)

*Acrocoris* n. gen.

Oval, kahl. Kopf klein, Stirnschwiele eingeschlossen. Schnabel schlankgliederig, an das Ende der Hinterbrust reichend. Fühlerglieder schlank, Wurzelglied kürzer als der Kopf, Glied 2 kaum kürzer als 1, Glied 3 das längste, an 4—5 mal länger als 2, Glied 4 nur  $\frac{2}{3}$  von 3, Glied 5..... (fehlt). Schulterecke des Pronotum spitz, rückwärts gerichtet, Pronotum-Seitenrand gezähnelt. Schild etwas über den halben Rücken lang, am Grunde breit, von der Mitte verschmälert, Ende zugerundet. Membran mit 7—8 Rippen. Bauchmitte schwach kielförmig; Bauchschiene 2 mit vorstehendem Spiess. Beine unbewehrt, lang; Klauenglied der Hinterfüsse schwächer als das Wurzelglied. Mittelbrust mit einem Mittelkiel. Wangenplatten linienförmig, vorn gestutzt, spitz-eckig, auf den halben Kopf lang.

Родъ этотъ также принадлежитъ къ группѣ Rhabigasterini, имѣющей на второмъ брюшномъ кольцѣ снизу длинный шипъ, который у *Astocoris* достигаетъ почти до половины среднегруди. Голова небольшая, *tulus* передъ концомъ нѣсколько вдавленный, закрытый складывыми отростками, концы которыхъ округлены и не со-прикасаются между собою; края этихъ отростковъ передъ глазами имѣютъ пологую выемку и нѣсколько загнуты кверху. Хоботокъ тонкощенистый, достигающій до конца груди; первый суставъ его на одну треть короче головы, почти равный четвертому; третій самый длинный, нѣсколько длиннѣе втораго. Усики тонкіе, довольно длинные; первый суставъ ихъ короткій, не достигающій конца головы, второй очень тонкій, нѣсколько короче первого, третій очень длинный — вчетверо или нѣсколько болѣе длиннѣе втораго; четвертый на  $\frac{1}{3}$  короче третьаго; штага сустава у моихъ экземпляровъ недостаетъ. Переднеспинка короткая, но сильно развитая въ ширину; плечевые углы вытянуты въ длинную лопасть выгнутую дугой, острое которой обращено кзади; передний край переднеспинки имѣеть возлѣ головы сильный зубецъ, далѣе же по всему протяженію, до самаго плечеваго остряя, усаженъ мелкими тонкими зубчиками, обращенными остряями кзади, такъ что имѣеть форму пилообразную; онъ сначала образуетъ очень пологую выемку, но затѣмъ переходя постепенно въ плечевую лопасть закругляется и завертывается назадъ, образуя довольно острый крючекъ, вершина которого нѣсколько срѣзана. Задній край переднеспинки передъ щиткомъ совершенно прямой. Щитокъ трехугольный, не широкій и довольно короткій, оканчивающійся тупымъ, плоскоокругленнымъ концомъ; боковые края его передъ концомъ значительно вогнуты. Надкрылья обык-

новеной формы, съ перепонкой едва длиннѣе брюшка; послѣдняя съ 7—8 выпуклыми ребрами, изъ которыхъ нѣкоторыя вѣтвятся отъ самаго основанія, другія же далеко не достаютъ до конца. Голова снизу имѣть сильно выпуклое горло; скудовыя пластинки (*bucculae*) линейныя, достигающія только до половины головы и впереди оканчивающіяся довольно сильнымъ зубцомъ. Вдоль среднегруди идетъ тупое ребро; конецъ ея прямо обрѣзанъ. Брюшной щипъ довольно тонкій и острый, достигающій почти половины среднегруди; средина брюшка слабо килеватая. Задніе углы брюшныхъ колецъ переходятъ въ небольшия, острые зубчики. Ноги тонкія, длинныя, невооруженные; лапки длинныя, второй суставъ ихъ очень тонкій и маленький; первый нѣсколько длиннѣе и массивнѣе третьаго. Когти сильные, придатки ихъ (*aroliae*) большие.

*A. serraticollis* n. sp.

Bleich bräunlich, oberseits grobpunctirt, Kopf, Rand des Corium, Schlussnath und Corium-Ende grünmetallisch. Schulterecke schwarz metallischviolett, Spitze orangegelb. Pronotum schwarzmetallisch punctirt. Halbdecken schwach metallischviolett. Schuld bräunlichgrün, ganz grob zerstreut punctirt. Unterseite bleich schmutzigrün, Bauch glatt, glänzend. Spiracula schwarz. Rücken, Connexivum und Beine bräunlich; Fühler schwarz, Wurzelglied blassbraun, am Ende schwarz. L. 16 — 17 mm.  
Ussuri.

Общій цвѣтъ туловища блѣднобуроватый, сверху оно грубо пунктировано. Голова сверху вся металлически-зеленаго цвѣта съ фиолетовымъ оттенкомъ. Простые

глаза яркокрасного цвета. Усики черные, основной суставъ ихъ светлобуроватый, только вершина его и полоски по наружному и внутреннему краямъ черного цвета. Хоботокъ, какъ и все туловище, снизу блѣднаго грязнозеленоватаго цвета. Переднеспинка покрыта рѣдкими, но крупными точками черного цвета, съ зеленымъ металлическимъ отливомъ. Плечевые отростки черные, съ металлическимъ фиолетовымъ оттенкомъ, а самое острее плечевыхъ угловъ—оранжеваго цвета. Щитокъ блѣднобуроватозеленый, покрытый до самаго конца сильными, но очень рѣдко расположеными черными точками. Надкрылья всѣ очень густо пунктированы, причемъ точки неправильной формы и часто сливаются между собою; края ихъ—наружный и внутренний прилегающій къ щитку (*clavus*), а также острый конецъ *coarium*—блестящаго металлически зеленаго цвета, средняя же часть надкрыльевъ блѣднаго металлически фиолетового цвета. Перепонка блѣднобурая, сильныя ребра ея оттѣнены съ обѣихъ сторонъ—болѣе темнымъ бурымъ цветомъ, также какъ и самый конецъ ея. Брюшко сверху, *Connexivum* и ноги одноцвѣтныя, буроватыя; ноги покрыты сильнымъ чернымъ пунктиромъ; брюшко гладкое, блестящее. Части груди покрыты слабымъ безцвѣтнымъ пунктиромъ. Дыхальца черныя. Снизу плечевые отростки представляются выдолбленными въ видѣ ложки или корыта. Дл. 16—17 мм.; ширина между плечевыми отростками—12 мм., а ширина брюшка—9 мм.

Уссури, подъ 48° с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

*Strachia festiva* L. var. *albiventris*.

Bauch weiss, schwarzgefleckt.

Отъ типической формы отличается тѣмъ, что на нижней сторонѣ туловища красный цветъ замѣненъ бѣ-

лымъ, только наружный край брюшка остается краснымъ. Основаніе бедръ средней и задней пары ногъ также бѣлаго цвѣта.

*Elasmostethus dorsalis* n. sp..

Ganz röthlichgelb, grob schwarzpunctirt, Cormum geröthet. Schulterecke spitz, schwarz. Rücken rothgelb, am Grunde schwarz. Connexivum röthlichgelb mit braunen Endflecken der Schnittstücke. Membran durchscheinend hell, mit braunen Rippen und Flecken. Bauch unten, Beine und Fühler bleich gelblich; Fühlerendglied, Schienbeinende und Klaugenglied — bräunlich. Bauchrand sehr zerstreut punctirt. L. 6 mm. (♂), 8 mm. (♀).

Ussuri.

Общій цвѣтъ туловища рыжій; вся поверхность покрыта глубокими черными точками, которыя на головѣ, концѣ щитка и среднемъ полѣ надкрыльевъ мельче, чѣмъ на остальныхъ частяхъ; вообще точки раскиданы рѣзко, кромѣ головы, где они сильно скучены. Грудь снизу, кромѣ широкихъ, боковыхъ краевъ переднеспинки, также грубо пунктирована; брюшко снизу, кромѣ поперечныхъ струекъ и морщинокъ, имѣеть по бокамъ очень рѣдкій пунктиру. Переднеспинка имѣеть такую же форму, какъ и у остальныхъ видовъ этого рода, только плечевые углы ея вытянуты въ длинное острое, нѣсколько загнутое кзади; такого сильнаго развитія плечевыхъ угловъ у другихъ видовъ не встрѣчается. Плечевые углы и первый сегментъ брюшка сверху чернаго цвѣта; остальные сегменты красновато-рыжіе, кромѣ послѣдняго, который всегда бываетъ темнѣе. Connexivum рыжій, въ заднихъ углахъ первыхъ трехъ сег-

ментовъ помѣщаются темнобурыя большія пятна. Боковой край надкрыльевъ, также какъ и у переднеспинки до плечеваго острея,—гладкій, бѣловатый; конецъ надкрыльевъ болѣе или менѣе красноватъ; перепонка прозрачная съ бурыми ребрами и пятнами въ задней ея половинѣ, которая часто сливаются между собою. Брюшко снизу, ноги и усики свѣтлорыжіе; послѣдній суставъ усиковъ, концы голеней и когтевой суставъ лапокъ—буроватый. Самцы менѣе ростомъ самокъ.

Судя по довольно большому количеству экземпляровъ, собранныхъ Dr. В. Дыбовскимъ, видъ этотъ не рѣдокъ на Уссури.

*Dinorhynchus* n. gen.

Körper oval. Kopf gross, sehr lang, Stirnchwiele kürzer als die vorn zugerundeten Jochstücke. Schnabel sehr stark, kurz, an das Mittelbrustende reichend; Wurzelglied kürzer als der Kopf. Wangenplatten linienförmig, vorn lappensförmig erweitert. Fühler sehr lang, Wurzelglied viel kürzer als der Kopf, Glied 2 sechs - siebenmal länger als 1 und fast so lang als 3, Glied 4 um  $\frac{1}{4}$  länger als 3, Endglied bogig, so lang als 3. Schulterecke spitz, stark vorstehend, Pronotum-Seiten vor den Schultern fast winkelig geschweift, Vorderhälfte ziemlich stark gezähnelt. Bauchgrundschiene mit spitzem Höcker. Membran mit neun Rippen. Beine lang, unbewehrt.

Родъ этотъ принадлежитъ къ группѣ Asopini и долженъ стоять возлѣ рода *Podisus*.

Тулowiще продолговатоovalное. Голова большая, очень длинная, въ полтора раза болѣе ширины въ за-

тылкѣ. *Tylus* короткій, скуловые отростки весьма длинные, листоватые, совершенно закрывающіе конецъ носа; напереди эти отростки закругляются и сходятся только своими концами, такъ что передъ *tylus* остается свободное пространство. Хоботокъ короткій и очень толстый, такъ что первый суставъ—самый массивный—равняется  $\frac{3}{4}$  ширины головы; этотъ суставъ короткій, не достигающій конца головы, второй длиннѣе прочихъ, сильно сжать у основанія съ боковъ и изогнутъ саблевидно, третій очень короткій и широкій, такъ что сверху кажется почти квадратнымъ, конецъ четвертаго сустава достигаетъ до начала заднегруди. Скуловыя пластинки листоватыя, короткія, кпереди широкоокругленныя, а кзади быстро переходятъ въ линейныя и не достигаютъ до заднаго конца головы. Усики тонкосуставчатые, очень длинные, такъ что равняются длиной головы, переднеспинки и щитка взятыхъ вмѣстѣ; первый суставъ ихъ очень короткій, достигающій только до половины головы, второй въ шестero или семеро длиннѣе первого и почти равенъ по длини третьему; четвертый на одну четвертую часть длиннѣе третьяго, послѣдній суставъ изогнутый (какъ у р. *Alydus*), гораздо короче четвертаго и равенъ третьему. Хурhus переднеспинки углубленный, трехугольный, съ сильнымъ продольнымъ ребромъ, которое переходитъ на среднегрудь. Переднеспинка съ сильно вытянутыми плечевыми углами, приподнятыми сверху и острее которыхъ обращено нѣсколько назадъ. Боковые края переднеспинки вырѣзаны и въ передней своей части сильно зазубрены. Основной суставъ брюшка снизу вооруженъ шипомъ. Ноги сильные, длинные, ребра невооруженныя. Перепонка узкая, длинная съ девятью ребрами.

D. Dybowskyi n. sp.

Oberseite ganz metallisch smaragdgrün, fein weiss behaart. Pronotum-Mitte metallisch dunkelblau, Schulterecke schwarzgrün; Seitenrand des Pronotum an dem körnig gezahnten Theile—weisslich. Pronotum und Schild mit bleicher rothbräunlicher durchlaufender Mittellinie. Tylus am Ende, Pronotum hinten, Schildspitze und Beine gleich bräunlichroth. Fühler schwarz, Glied 1 gleich bräunlich, schwarz gestreift; Endglied bräunlich. Schenkel braungefleckt; Schienbeinende und Füsse braun; Connexivum schwarz mit rothgelbem queren Mittelfleck. Unterseite und Schnabel gleich gelblich, Schnabelglied 4—schwarzbraun. Spiracula schwarz. L. 18 mm.

Insel Askold.

Голова, переднеспинка и щиток весьма сильно пунктированы, на надкрыльяхъ пунктиръ гораздо нѣжнѣе. Вся наружная поверхность—прекрасного, металлическаго изумрудноzelенаго цвѣта, покрыта нѣжными бѣловатыми волосками; поперекъ переднеспинки идетъ широкая полоса металлическаго синяго цвѣта; плечевые углы темнозеленые. Зубцы переднеспинки бѣловатые. Конецъ носа, продольная линія переднеспинки и щитка, задній край переднеспинки, конецъ и бока щитка, ребра надкрыльевъ и ноги—блѣднаго красноватобураго цвѣта. Нижняя сторона наськомаго и хоботокъ блѣднопалеваго цвѣта, послѣдній суставъ хоботка темнобурый. Дыхальца и усики черные; первый суставъ ихъ свѣтлобурый, съ черными полосами, послѣдній буроватый. Бедра покрыты темными пятнами и полосками, концы голеней и лапки бурыя; второй суставъ лапокъ и основанія пер-

ваго и третьяго—рыжіе. Съ каждой стороны переднегруди по три пятна изумруднозеленаго цвѣта; перепонка бурая; *connexivum* черный, съ рыжими поперечными полосками по срединѣ каждого сегмента. Длина безъ перепонки 15 — 16 мм., съ перепонкой — 18 мм.; ширина между плечевыми углами 9 мм., передъ концомъ щитка —  $6\frac{1}{2}$  — 7 мм.

Одинъ экземпляръ этого вида взять Dr. Дыбовскимъ на островѣ Аскольдѣ (Японское море подъ  $43^{\circ}$  с. ш.)

### Fam. *Lygaeides*.

*Lygaeus venustus* Böb. var. *marginatus* m.

Clavus schwarz, am Ende roth; Corium schwarz,  
alle Ränder roth gesäumt.

Поперечная черная перевязка на надкрыльяхъ имѣть форму большаго трехугольнаго пятна, которое доходитъ до конца *corium*, нигдѣ однако не достигая его краевъ; такимъ образомъ *Corium* является чернымъ, ограниченнымъ со всѣхъ сторонъ красными краями. Clavus черный, конецъ его красный. Нѣжныхъ стоячихъ волосковъ, которые есть у типической формы на переднеспинкѣ, у этой разновидности не замѣтно. Перепонка свѣтлѣе; именно буроватая, съ бѣлою широкою оторочкою. Разновидность эта такой же величины, какъ и типическая форма, но нѣсколько уже послѣдней.

Одинъ экземпляръ съ береговъ Уссури, подъ  $48^{\circ}$  с. ш. (Dr. Дыбовскій.)

### Fam. *Tingitides*.

*Monanthia capitata* n. sp.

Pronotum-Mittelkiel fein, Seitenkiel fehlt. Pronotum - Seiten mit feinem Randkiel. Rand-

feld der Netzdecken linear, nur mit einer Reihe Maschen. Braungelb, kahl. Kopf, Bruststücke und Bauch am Grunde schwarz. Mittelfeld am Ende und zwei Fleckchen an dem Vordertheil des Pronotum dunkelbraun. Beine, Fühler und Kopfdorne—röhlichgelb. L.  $3\frac{1}{2}$  mm.  
Ussuri.

Относится къ подроду *Tropidochila*. Боковые края переднеспинки оторочены весьма тонкимъ кантикомъ; вдоль переднеспинки до конца отростка (processus) идетъ очень нѣжное срединное ребро; боковыхъ реберъ нѣть, или замѣтны только очень слабые слѣды ихъ. Боковой край сагенъ очень узкій, почти линейный, въ одинъ рядъ клѣточекъ. Голова, грудь и основныя кольца брюшка снизу чернаго цвѣта; остальное туловище буровато-рыжее, только два пятна въ передней части переднеспинки и широкіе концы внутренняго поля сагенъ—темнобурые. Широкое шейное пятно и скапловыя пластинки бѣловатыя. Мелкія клѣтки перепонки бурыя. Ноги, усики и тупые головные шипики красновато-рыжаго цвѣта. Все туловище безволосое, неблестящее, кроме переднеспинки, на которой замѣтенъ слабый полуметаллическій блескъ. Дл.  $\frac{3}{2}$  мм., ширина около 1 мм.

Отъ другихъ видовъ *Tropidochila* отличается, съ первого взгляда, отсутствиемъ боковыхъ реберъ на переднеспинкѣ и большою головой чернаго цвѣта.

Одинъ экземпляръ этого вида найденъ Dr. Дыбовскимъ на Уссури, подъ  $48^{\circ}$  с. ш.

**M. (*Platychila*) *helvina* n. sp.**

Bräunlichgrau, ganz weisslich behaart. Kopf schwarz dicht weissfilzig. Pronotum-Mitte dun-

kelbraun. Beine und Fühler bleichröhlichgelb. Netzdecken und Membran kleinfleckig; Mittelkiel des Pronotum am Ende—schwarz. Pronotum-Seiten schmal mit einer Reihe Maschen, Randfeld der Decken mit zwei Reihen kleiner Maschen. Halsblase fast viereckig, vorn gestutzt. Pronotum mit drei Kielen. L. 3 mm. Ussuri.

Все насекомое густо покрыто короткими беловатыми волосками, прилегающими на сагенахъ и нѣсколько приподнятыми на переднеспинкѣ; голова покрыта ими въ видѣ войлока, такъ что кажется беловатою. Непширокія боковыя лопасти переднеспинки образованы изъ одного ряда клѣточекъ; боковой край сагенъ, также довольно узкій, состоить изъ двухъ рядовъ мелкихъ клѣточекъ. Боковыя лопасти переднеспинки кпереди расширяются; передний край переднеспинки прямообрѣзанъ и вдвое шире головы, боковые края также прямые, плоскоокругленные на плечахъ. Шейный пузырь почти четырехугольный, плоскій, прямообрѣзанный на концѣ. Ребра переднеспинки явственныя. Весь буроватосѣраго цвѣта; голова, нѣсколько пятнышекъ на сагенахъ и перепонкѣ, продолговатое пятно на среднемъ ребрѣ переднеспинки передъ концомъ ея и крупная точки на попеченныхъ ребрахъ крайнихъ клѣтокъ сагенъ—чернаго цвѣта. Средняя часть переднеспинки буроватая. Ноги и усики однопрѣстные, свѣтлорыжеватые, густо покрытые волосками. Дл. 3 мм.; ширина въ плечахъ — 1 мм., передъ концомъ processus —  $1\frac{1}{2}$  мм.

Съ береговъ Уссури подъ 48° с. ш., только въ одномъ экземпляре (Dr. Дыбовскій.)

Fam. Aradides.

*Aradus ussurensis* n. sp.

Fühler stark, Glied 1 kurz, nicht an das Kopfende reichend, Glied 3 um  $\frac{1}{4}$  länger als 2 und so lang als 4. Fühlerglieder schmutzigweiss, Glied 2 und 3 am Ende und Glied 3 am Grunde bräunlich, Endglied dunkelbraun. Zimmtbraun; Pronotum, Schild und Halbdecken schmutziggelbweiss. Kopf bräunlich. Schnabel auf die Mittelbrustmitte reichend. Pronotum am Rande gezahnt. Schild sehr vertieft, Rand hoch, Schildspitze muldenförmig, schwarz. Kopf, Pronotum und Schild -- kleinwarzig. Kiele stark, die seitlichen vorn zusammengebogen, die mittleren in der Mitte genähert. Halbdecken nicht vollkommen, rudimentär (♀). Beine schmutzigweiss, braungeringelt. L.  $6\frac{1}{2}$  mm. (♂); 8 mm. (♀).

Ussuri.

Усики грязноватобѣлые, третій суставъ ихъ па четверть длиные втораго, который равенъ четвертому; первый суставъ короткій, недостигающій конца носа, на половину короче третьяго; послѣдній темнобурый, средина его свѣтлѣе; вершина втораго и третьяго и основаніе третьяго суставовъ буроватая, также какъ основаніе и наружная сторона первого сустава. Туловище каштановобураго цвѣта, переднеспинка, щитокъ и надкрылья грязныя, желтоватобѣлые. Голова буроватая, шипики на ней свѣтлѣе, сзади глазъ нѣсколько бѣловатыхъ шипиковъ. Острый шипъ поддерживающій усики—двойной. Скуловыя пластишки бѣловатыя. Хоботокъ

достигающій до половины среднегруди—буроваточерный, первый суставъ его бурый, у основанія бѣловатый. Переднеспинка съ краями зубчатыми; зубчики небольшіе, неправильной формы; шейный уголъ оканчивается широкимъ зубцомъ, на вершинѣ обрѣзаннымъ. Плечевые углы и углубленія передней половины переднеспинки буроватыя. Тупые и широкіе плечевые углы сильно приподняты вверху. Ребра переднеспинки сильныя, изогнутыя; наружный въ видѣ дуги загибающейся кпереди и далеко не достигающей до передняго края, внутреннія ребра сближены по срединѣ, образуя приблизительно форму цифры 8. Щитокъ сильно углубленный, съ высоко поднятыми боковыми краями, усаженными тупыми зубчиками; конецъ его съуженъ, почти сплюснуть съ боковъ, — чернаго цвѣта. Голова, переднеспинка и особенно щитокъ усажены плоскими бородавочками. Надкрылья ( $\delta$ ) у основанія округленныя, кзади сильно съуживающіяся; боковой край ихъ съ мелкими бородавочками; на концѣ надкрыльевъ и вдоль главнаго ребра съ внутренней стороны нѣсколько черныхъ пятенъ. Перепонка буроватая съ болѣе свѣтлыми ребрами и поперечными полосками. У самокъ надкрылья неполные, зачаточные, покрывающія только третью брюшка. Брюшко широкоовальное у  $\varphi$  и съ болѣе прямыми боками у  $\delta$ . Connexivum съ бѣловатыми пятнышками въ заднихъ углахъ сегментовъ; послѣдній генитальный сегментъ съ сильнымъ тупымъ зубцомъ снаружи, внутренняя его сторона бѣловатая. Ноги грязноватобѣлые съ буроватыми кольцами на бедрахъ и голеняхъ. Послѣдний суставъ лапокъ бурый.

Уссури, подъ  $48^{\circ}$  с. ш. (Dr. Дыбовскій), въ небольшомъ числѣ экземпляровъ.

Fam. Capsides.

*Lopus affinis* n. sp.

Ganz braunschwarz, schwarz behaart. Kopf mit weisslichen Flecken vorn an den Augen; Rand des Corium weiss, Cuneus schwarzbraun. Fühler schwarz, Fühlerglied 1 am Ende und Glied 2 am Grunde bräunlich. Schenkelende und Schienbeine schmutzig braungelb. Corium—Rand weiss behaart. L. 6 mm.

Kurusch (Kaukasus.)

Весь темнобурый; два пятна впереди глазъ и пазухный край надкрыльевъ бѣлые. Синеус бурый, задний край его и конец—темнѣе. Голени и концы бедръ грязнаго буроватожелтаго цвѣта. Усики черные, вершина первого сустава ихъ и основаніе втораго бурые. Наружная сторона покрыта длинными стоячими черными волосками, на боковыхъ краяхъ надкрыльевъ такие же волоски бѣлаго цвѣта. Дл. 6 mm.

Видъ этотъ очень близокъ съ *L. albomarginatus* Klg., но отличается однообразнымъ бурочернымъ цвѣтомъ головы, переднеспинки, щитка и синеус.

Курушъ, на Кавказѣ (Фаустъ, Христоффъ и Беккеръ).

*Calocoris rubripes* n. sp.

Graugelb, dicht anliegend behaart. Kopf gelb, braun quergestrichelt, Stirnenschwiele am Ende bräunlich. Fühlerwurzelglied braunroth, Glied 2 schmutziggelb am Grunde und an der oberen Hälften—röhlichbraun; Glied 3 am Grunde weisslich. Pronotum grobpunctirt, vor dem weissen Hintersaume mit braunem Bande. Pro-

notum - Callus schwarz. Schild fein querun-  
zelig, braun; Schildspitze und Callus — weiss-  
lich. Cuneus weisslich, bräunlich gesäumt.  
Membran bleichbräunlich, Zellrippen schmut-  
ziggelb. Unterseite bleichgelblich, roth gespren-  
kelt. Schenkel gelblich, am Ende roth; Schien-  
beine ganz roth, goldgelb behaart und gewim-  
pert. Füsse bräunlichgelb, Klauenglied — braun.  
L. 8 mm.

Ussuri.

Весь желтоватосърый, густо покрытый такого же цвета прилегающими волосками. Голова и узкий кантикъ на переднемъ краѣ переднеспинки — желтые. На затылкѣ между глазами два бурыхъ пятна, впереди ихъ на лбу расположены въ два ряда нѣсколько поперечныхъ, параллельныхъ между собою черточекъ — также бурого цвета. Tylus на концѣ буроватый. Первый суставъ усиковъ буроватокрасный, второй грязнорыжий, основание его и широкая вершина красноватобурыя, также какъ и послѣдніе два сустава; основаніе треть资料-го сустава — бѣловатое. Голова гладкая, блестящая, съ глубокой продольной бороздкой на затылкѣ; переднеспинка грубоупункирована; передняя ея часть также какъ и довольно широкая полоса вдоль задняго края — бурыя, узкая оторочка задняго края — бѣловатая. Гладкія возвышенія въ передней части переднеспинки — темнобурыя, почти черныя. Щитокъ покрытый нѣжными поперечными морщинками, весь бурый, только два пятна въ основныхъ углахъ его и кончикъ — бѣловатыя. Надкрылья одноцвѣтныя, нѣсколько бурѣющія къ концу; cuneus бѣловатый, узкая окраина его наружная и задняя — блѣднобуроватыя. Ребра мембранныхъ клѣтокъ грязно желтоватыя, самая перепонка свѣтлобуроватая;

внутри клѣтокъ—бурыя полосы; ниже синеус замѣтно бурое пятнышко и передъ концомъ перепонки — бурая поперечная полоса. Нижняя сторона туловища блѣдно-желтоватая, покрытая рѣдкими красноватыми пятнышками. Бедра желтоватыя, концы ихъ, широкое кольцо по срединѣ каждого бедра и голени — краснаго цвѣта; послѣднія покрыты густо золотистожелтыми приподнятыми волосками и шипиками. Лапки и когти рыжеватыя, послѣдній суставъ лапокъ—на концѣ буроватый.

Одинъ экземпляръ этого вида былъ взятъ Dr. Дыбовскимъ на Уссури, подъ 48° с. ш.

*Lygus adustus* n. sp

Ganz punctirt und goldgelb behaart. Kopf braunröhlich, Stirnschwiele schwarz. Querleiste im Nacken braun, Pronotum grünlichgelb, vor dem lichten Hintersaume mit dunkelbraunem Bande. Schild grünlichgelb, am Grunde braun. Halbdecken schwarz mit grünlichem Bande. Cuneus orangegelb, am Ende schwarz. Bauch und Bruststücke schwarz, Kopf unten und Vorderbrust bleichgelblich. Beine röhlichgelb, Schenkel bräunlichroth. Schienbeine aus schwarzen Puncten schwarz behaart. Fühler rothgelb, Glied 2 am Ende schwarz, Glied 3 und 4 dunkelbraun. L. 5 mm.

Ussuri.

Весь пунктированный и покрытый нѣжными прилегающими волосками желтоватаго цвѣта; на передненасинкѣ пунктиръ очень нѣжный, на надкрыльяхъ грубѣе и гуще расположень, такъ что точки между собою часто сливаются. Голова почти гладкая. Щитокъ мелко

пунктиранъ, кромъ того поперекъ его проходитъ нѣсколько сильныхъ морщинокъ. Голова рыжеватая, *tullus*—чернаго цвѣта, затылочный кантикъ и пятно на лбу между глазами—темнобурыя. Переднеспинка зеленоватожелтая, съ рыжеватымъ оттѣнкомъ кпереди; на задней половинѣ довольно широкая, темнобурая полоса, самый же кантикъ идущій по краю—свѣтложелтоватый, Щитокъ зеленоватожелтый, основаніе его, особенно углы—темнобурые. Надкрылья чернаго цвѣта, поперекъ *sorium*, отъ средины его къ внутреннему углу идетъ широкая зеленоватая полоса; боковой край надкрыльевъ—до *cuneus*—чернаго цвѣта; *cuneis* оранжевожелтый, кончикъ его черный, а основаніе темнобурое. Перепонка буроватая; внутри ихъ ближе къ наружному краю—по темнобурому пятну; широкій край перепонки—дымчатобурый, на этомъ фонѣ, ниже острея *cuneus*,—расположены два свѣтлыхъ пятна. Брюшко сверху и снизу, также какъ и грудь,—чернаго цвѣта. Голова снизу и переднегрудь свѣтложелтая. Хоботокъ и ноги рыжіе, бедра кромъ основанія—красноватыя, особенно у двухъ заднихъ паръ ногъ; на заднемъ бедрѣ два широкихъ темнобурыхъ кольца и одно—узкое, ближайшее къ вершинѣ. На остальныхъ бедрахъ по два широкихъ кольца, но они не всегда бывають ясно выражены, особенно на первой парѣ. Голени снизу покрыты крупными черными точками и черными же шипиками, самыя основанія ихъ и концы,—также какъ и два послѣдніе сустава лапокъ,—темнобурые; когти рыжіе. Усики красноваторыжіе, широкая вершина втораго сустава чернаго цвѣта, четвертый и пятый суставы—темнобурые. Гладкія возвышенія на передней части переднеспинки бывають иногда свѣтлые, или же темнобурые. Дл. 5 мм.

Видъ этот долженъ быть поставленъ рядомъ съ *L. limbatus* Fall., съ которымъ его сближаютъ нѣкоторые признаки, напр. пятнистость голеней, черные шипики расположенные на нихъ и проч.

Собраны въ большомъ количествѣ Dr. Дыбовскимъ на Уссури, подъ 48° с. ш.

*Psallus rubronotatus* n. sp.

Weissgelblich; Kopf und Pronotum glänzend, kahl, Halbdecken und Abdomen matt, dicht goldgelb feinbehaart. Kopf im Nacken roth quergestrichelt. Pronotum-Buckel und Seitenstreif rothgesprenkelt; Schulterecke und zwei Hinterrandflecken schwärzlich. Schild röthlich mit weissem Callus in jedem Winkel und mit gelber durchlaufender Mittellinie. Die breite Querbinde an der Hinterhälfte des Corium braun. Cuneus weisslich, ohne Flecken. Fühler bräunlichgelb, Glied 1 und 2 am Grunde—schwarz, Fühlerwurzel am Ende weisslich, Glied 3 und 4 bräunlich. Brust und Bauchgrund schwarz, Bauchrand rosenroth. Beine weisslich, schwarz-punctirt, Schienbeindorne schwarz. L. 4 mm. Sarepta.

Голова и переднеспинка блестящія, безволосыя, надкрылья и брюшко матовыя, довольно густо покрытыя очень нѣжными, прилегающими, желтоватыми волосками. Голова и переднеспинка бѣловатыя, также какъ надкрылья и брюшко. Tylus ограниченъ красными полосками; на головѣ между глазами нѣсколько поперечныхъ красныхъ черточекъ образуютъ рисунокъ напоминающей букву O. Callus переднеспинки густо усыпанъ красными

точками, двѣ полоски идущія вдоль боковъ переднеспинки также образованы изъ подобныхъ точекъ. Плечевые углы и два небольшихъ пятна на заднемъ краю переднеспинки передъ щиткомъ черноватые. Щитокъ красноватый, въ основныхъ углахъ его два большихъ голыхъ возвышенія бѣловатаго цвѣта, ниже ихъ пара вдавленныхъ черныхъ пятнышекъ; вдоль щитка замѣтна желтоватая полоска. Согiцт, бывающiй иногда съ розоватымъ оттенкомъ, на концѣ имѣетъ широкую, бурую поперечную полосу, которая захватываетъ и конецъ clavus. Cuneus бѣловатый, задняя треть его бурая. Перепонка блѣдная, дымчато-бурая, къ концу постепенно темнѣющая, ребра ея клѣтки бѣловатыя, а самыя клѣтки безъ пятенъ. Усики рыжеватые, а основанія первого и втораго суставовъ черныя, вершина первого сустава бѣловатая, третiй и четвертый суставы буроватые. Части груди и основаніе брюшка снизу черныя, широкіе боковые края брюшка розовые. Ноги бѣловатыя, бедра и голени покрыты черными, довольно крупными точками; на концахъ бедръ и на голеняхъ шипики черные. Дл. 4 мм. Сарепта (Беккеръ.)

Видъ этотъ напоминаетъ *P. punctulatus* Fieb. et Pil., который также разрисованъ красными линіями, точками и пятнами, но у этого вида расположение рисунка совершенно иное и кромѣ того много отличий въ цвѣтѣ другихъ частей туловища.

*Achenocrepis Reuteri* n. sp.

Schwarz und weiss, glänzend, sehr fein behaart, Kopf braunroth, Tylus schwarz. Fühler schwarz, fein weisslichbehaart, Glied 3 und 4 rothgelb. Schild, Clavus, Kopf unten, Xyphus, Hüften, Bruststücke, Bauchgrund und Schen-

kel—weiss. Schild am Grunde röthlichgelb.  
Clavus-Grund und Ende, auch Hinterschenkel  
am Ende — schwarz. Schienbeine schwarz, Füsse  
schmutzigelb. L. 3 mm.

Krasnowodsk.

Черный, блестящий мѣстами, покрытый весьма нѣжными  
едва замѣтными волосками. Голова буровато-красная, tylus  
и пятно на лбу темнобурыя, почти черных (впрочемъ пятно  
на лбу не у всѣхъ экземпляровъ выражено ясно). Усики  
черные, покрытые нѣжными бѣловатыми волосками, тре-  
тій и четвертый суставы ихъ яркорыжіе. Щитокъ бѣлый,  
широкое основаніе его яркооранжеваго цвѣта; clavus  
бѣлый, основаніе его и конецъ черные; надкрылья очень  
темные, красноватобураго цвѣта, кажущіяся почти чер-  
ными; узкая часть corium прилегающая къ clavus—бѣ-  
лая; cuneus черный, основаніе его краснобурое.

Перепонка дымчатобурая, ребра ея клѣтокъ красно-  
ватобурыя, пятно ниже cuneus—бѣловатое. Голова снизу,  
средина груди, основаніе брюшка, основанія ногъ и  
бедра передней пары—бѣлые, бедра средней пары бѣлые,  
на вершинѣ буроватыя, бедра задней пары черные, съ  
бѣлымъ основаніемъ. Голени всѣ черные; лапки гряз-  
норыжеватыя, послѣдній суставъ ихъ темнѣе. Брюшко  
и бока груди блестящія черных. Дл. 3 mm.

Красноводскъ (Христоффъ, Faustъ.)

Видъ этотъ близокъ къ *A. alboscutellatus*, описанному  
Пютономъ изъ Алжира, но уже съ первого взгляда от-  
личается по цвѣту усиковъ и головы.

*Agalliaestes pumilus* n. sp.

Ganz bleich röthlichgelb, fein weisslich behaart  
und gewimpert. Fühler weissgelblich, Glied 1

ganz schwarz. Halbdecken weisslich, fast durchsichtig, fein braun punctirt gefleckt. Beine gelblichweiss, Clauenglied braunlich; Schenkel am Ende — besonders die hinteren — unterseits schwarzgefleckt; Schienbeine aus braunschwarzen Puncten schwarz bedornt. Membran milchweiss, Zellrippen braunlich, braun gesäumt; im Aussengrundwinkel der Membran ein brauner Winkelfleck bis zur Corium-Ecke, unterhalb ein Randstreif schwarz. L. 2 mm.

Astrachan.

Все туловище розоватожелтаго цвета; наружная сторона, кроме весяма нѣжныхъ шелковистыхъ волосковъ, покрыта еще довольно рѣдкими длинными стоячими волосками бѣловатаго цвета. Усики блѣдножелтоватые, первый суставъ ихъ весь черный. Голова, переднеспинка и щитокъ одноцветные, безъ пятенъ и точекъ; надкрылья бѣловатыя, полупрозрачныя, покрытыя мелкими буроватыми точками. Перепонка почти молочно-блѣлого цвета, ребра кѣсточекъ буроватыя, съ внутренней стороны отѣненные; отъ внутренней мембранный кѣстки идеть къ концу перепонки узкая буроватая полоска, которая отдѣляеть отъ себя такую же вѣточку къ виѣшнему боковому краю перепонки, иѣсколько ниже конца cuneus. Во внутреннемъ углу перепонки, по ея краю идеть черная полоска. Ноги свѣтложелтоватыя, кроме послѣдняго сустава лапокъ и когтей, — которыхъ бурыя. Концы бедръ снизу покрыты черными точками; голени также несутъ темнобурыя точки съ такого же цвета шипиками. Дл. 2 мм. Селеніе Яндыковское, Астраханской губерніи, въ концѣ мая.

Fam. Reduviides.

**Harpactor Dybowskyl n. sp.**

Schwarz, ziemlich glänzend, grau behaart. Kopf unten, Brustmitte, Schnabelwurzel, zwei Striche an den Augen und ein Fleck zwischen den Ocellenhöckern — gelb. Seiten und Hinterrand des Pronotum röthlich. Schild ganz schwarz. Connexivum gelb, oder roth, die Grundhälfte der Schnittstücke schwarz. Halbdecken schwarz, oder braun. Beine ganz gelb, bisweilen Schenkel bräunlichroth L. 12 — 13 mm.

Ussuri.

Черного цвета, довольно блестящий, покрытый не густыми съроватыми волосками. Первый сустав хоботка съ внешней стороны, голова спизу, средина груди и части ея у основания ногъ, пятно на затылкѣ и по пятнамъ передъ каждымъ простымъ глазомъ — желтаго цвета. Задний и боковые края переднеспинки желтоватокрасные, (у некоторыхъ экземпляровъ вся переднеспинка бываетъ сполна чернаго цвета); щитокъ весь черный. Connexivum желтый, или красный, съ черными или темнобурыми крупными пятнами въ основаніяхъ каждого сегмента. Надкрылья буроватыя съ темнобурыми сильными ребрами, или же бываютъ почти вполнѣ чернаго цвета. Перепонка дымчатобурая, внутренній край ея светлѣе. Брюшко иногда совершенно черное, блестящее, иногда же по срединѣ его идетъ светлая, буроватожелтая довольно широкая полоса. Ноги или совершенно желтаго цвета, или бедра бываютъ, за исключеніемъ основания и конца, — буроватокрасныя; на бедрахъ снизу видны два полукольца желтаго цвета, одно у основания, другое по срединѣ. Дл. 12 — 13 мм.

У этого вида цвѣтъ нѣкоторыхъ частей тулowiща бываетъ очень измѣнчивъ, только головныя пятна и цвѣтъ груди и головы снизу—остается всегда постояннымъ. Н. Dybowskyi ближе всего стоитъ къ И. sag-nifex Muss., но между ними есть разница въ строеніи переднегруди, формѣ шейнаго кольца, величинѣ и окраскѣ.

Нѣсколько экземпляровъ этого вида было собрано Dr. Дыбовскимъ на Уссури, подъ 48° с. т.

Астрахань  
Августъ 1876 г.

---