

Bauch grünlichgelb, mit braunem Seitenstreif. L.
6 mm. Sarepta.

Туловище и ноги зеленоватожелтыя; носовой валикъ, два пятна на затылкѣ около глазъ, переднеспинка, передняя половина clavus, внутренняя поверхность scutum, брюшко сверху и вершина третьяго сустава усиковъ — темнобураго, почти чернаго цвѣта; середина головы, широкая продольная полоса и боковыя края переднеспинки, также узкая задняя окраина ея, шейное кольцо и щитокъ — желтаго цвѣта; узкіе боковыя края щитка — черныя. Широкіе, наружныя края scutum, весь cuneus, вторая половина clavus и усики красноватожелтыя; конецъ cuneus красноватый. Перепонка дымчатобурая, одноцвѣтная, ребра ея клѣтокъ желтоватокрасныя. Щеки, первый суставъ хоботка и основаніе ногъ — зеленоватые; ноги, особенно голени, рыжеватыя, концы заднихъ бедеръ буроватокрасныя, лапки буроватыя. Брюшко зеленоватожелтое, съ широкими бурными полосами по бокамъ. Вся поверхность полублестящая, нѣжно пунктированная, покрытая очень короткими и тонкими желтоватыми волосками. Первый суставъ усиковъ и бедра покрыты очень нѣжными и короткими черными волосками. Шипики голеней очень рѣдкіе, чернаго цвѣта. Дл. 6 мм.

Новый родъ — *Stenotus* относится къ группѣ *Phytocoraria* Reut.

Calocoris capitatus n. sp.

Bleich schmutziggelb, dicht goldgelb anliegend behaart. Kopf bräunlichroth, Vordertheil und Tylus schwarz; zwei Flecke im Nacken röthlichgelb. Kopf und Pronotum glänzend. Pronotum grobpunctirt, mit zwei schwarzen Flecken;