

ко. Ребра кѣтокъ буроватя, а мѣсто соединенія реберъ (большой и малой кѣтокъ) — красное; внутренность кѣтокъ однообразнаго блѣднобуроватаго цвѣта, около кѣтокъ внутри—болѣе свѣтлая тѣнь; нижняя сторона туловища грязноватожелтая; дыхальца и широкая полоса вдоль брюшка темнобурыя, конецъ брюшка — красноватый; сверху брюшко темнобурое; на груди нѣтъ темныхъ пятенъ. Хоботокъ и ноги рыжеватые; первый суставъ хоботоска красноватый. Концы бедръ и голени съ сильными черными шипами; передняя пара бедръ желтоватая съ болѣе или менѣе правильными рядами красныхъ пятенъ; бедра задней пары красноватя съ тремя рядами темнобурыхъ пятенъ на нижней сторонѣ; кромѣ того на концѣ бедръ замѣтно по темному кольцу, впереди котораго помѣщается другое, свѣтлое кольцо. Голени одноцвѣтными, безъ точекъ и полосъ; послѣдній суставъ лапокъ на концѣ, когти и кончики голей—буроватые. Усики одноцвѣтные, желтоватые, широкія вершины втораго и третьяго суставовъ и весь четвертый—красноватя. Второй суставъ почти всюду равной толщины, или очень незамѣтно утолщается кверху. Дл. $6\frac{1}{2}$ мм.

Pachytoma rugicollis n. sp.

Körper breitoval, ganz schwarz, matt, oben gelblichweiss anliegend behaart. Kopf, Pronotum und Schild ziemlich grob und dicht quer-runzelig. Halbdecken fein und sehr dicht runzelig punctirt. Membran rauchbraun, an Grunde schwarz. Auf dem Scheitel an jedem Auge ein Bogen und Jochstücke weisslich. Fühlerwurzel massiv, schwarz, stark schwarz beborstet, Glied 2 röthlichgelb, am Ende bräunlich. Bei-