

ne schwarz, Schenkelende und Schienbeine röthlichgelb, schwarz bedornt. Schienbeine am Grunde unten—braun. L. $3\frac{1}{2}$ mm. Sarepta.

Туловище широкое, укороченное, черного цвѣта, одѣтое сверху мелкими желтоватобѣлыми прилегающими волосками. Голова, особенно же переднеспинка и щитокъ покрыты ясными, поперечными морщинками, очень густорасположенными; надкрылья весьма нѣжно и густо пунктированы, причемъ точки пунктира сливающіяся. Перепонка дымчатобураго цвѣта, къ основанію чернѣющая; ребра мембранальныхъ клѣтокъ черныя. Полоски окружающія глаза и скуловые части бѣловатыя. Первый суставъ усиковъ массивный, черный, съ сильными же черными шипиками; второй суставъ рыжій, къ вершинѣ бурѣющій послѣдніе суставы буроватые, одѣтые весьма нѣжными прилегающими рыжеватыми волосками; на второмъ суставѣ кромѣ того находится нѣсколько очень тонкихъ и длинныхъ стоячихъ волосковъ. Бедря, концы голеней и лапки съ когтями черного цвѣта; вершина бедръ и голени свѣтлорыжеватыя съ черными шипиками; основаніе голеней съ внутренней стороны темнобурое. Дл. $3\frac{1}{2}$ мм.

Globiceps fulvicollis n. sp.

Kopf schwarz, glänzend. Pronotum und Schild gelbroth, Vorder-und-Hinterrand des Pronotum, Schildende und Winkel — schwarz. Halbdecken ohne Membran (♀) schmutzigweissgelb, Clavus und Cuneus röthlichgelb. Die Endbinde des Corium und Clavusende—braun. Fühler gelbbräunlich, Wurzelglied gelblich; Glied 2 nach oben bedeutend verdickt. Beine gelbbräunlich, Schien-