

чти шарообразна и велика, такъ что, взятая вмѣстѣ съ глазами, гораздо шире основанія переднеспинки.

Orthotylus minutus n. sp.

Grün, gleichmässig silberweiss behaart und schwarz bewimpert. Pronotum kürzer als der Kopf. Fühler bleich bräunlichgelb, Wurzelglied und Glied 2-am Grunde grün. Membran bleich rauchbraun, am Grunde hell; Zellerippen grünlichweiss. Schenkel grün, Schienbeine und Füsse grünlichweiss, Klauen schwarz. Schienbeindorne sehr fein, lang, weisslich. L. $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$ mm. Astrachan.

Весь яркозеленый; поверхность покрыта черными полустоячими и серебристобѣлыми волосками, только голова и передняя часть переднеспинки одѣты исключительно одними бѣлыми волосками. Перепонка однообразнаго, блѣднаго буроватаго цвѣта, къ основанію нѣсколько свѣтлѣющая, сильно опализирующая; ребра ея клѣтокъ почти молочнобѣлаго цвѣта съ зеленоватымъ оттѣнкомъ; иногда вся перепонка бываетъ безцвѣтная, полупрозрачная. Усики нѣжные; первый суставъ ихъ, основаніе второго—зеленаго цвѣта, остальное — блѣднаго буроватожелтаго цвѣта. Бедря всѣхъ ногъ зеленая, голени и лапки блѣднозеленоватыя, почти бѣловатыя, иногда, особенно у сухихъ экземпляровъ, съ желтымъ оттѣнкомъ; когти чернаго цвѣта. Голени гладкія; усаженные длинными, рѣдкими и весьма нѣжными, едва замѣтными щетинками бѣловатаго цвѣта. Переднеспинка очень короткая, болѣе чѣмъ вдвое короче ширины ея задняго края и нѣсколько короче головы.—Самый маленькій видъ этого рода, такъ что въ длину достигаетъ отъ $2\frac{3}{4}$ до $3\frac{1}{4}$ мм.