

Описываемый видъ очень похожъ на *A. nasutus* Кб., но отличается, главнымъ образомъ, болѣ узкой и вытянутой головой и болѣ съуженною переднеспинкою.

*Aprosternus albipes* n. sp.

Ganz schwarz, goldgelb behaart und schwarz beborstet; Corium schwarzbraun. Membran braun, Zellrippen schwärzlich, ein Querstreif im Ausseugrundwinkel und Binderippe — weiss. Zellen licht. Fühler stark, röthlichgelb, Englied — bräunlich. Schenkel und Klauenglied mit Klauen — schwarz, Vorderschenkel und Schenkelende röthlichgelb. Schienbeine weiss, schwarz bedornt. Schnabel ganz braunschwarz. L. 3 mm. Sarepta.

Весь черный, одѣтый прилегающими золотистожелтыми волосками и черными щетинками; corium просвѣчиваетъ буроватымъ. Перепонка темнобурая, съ такими же ребрами клѣтокъ, кромѣ поперечнаго ребра, соединяющаго обѣ клѣтки, которое бѣлаго цвѣта; поперечная полоска перепонки ниже cuneus — бѣловатая; внутренность клѣтокъ свѣтлая. Усики красноватожелтые, послѣдній суставъ буроватый. Бедря черного цвѣта, кромѣ передняго, которое имѣетъ этотъ цвѣтъ толко въ основной половинѣ, остальные же части его красноватаго цвѣта; вершины бедръ остальныхъ паръ ногъ рыжеватыя. Голени бѣлаго цвѣта съ сильными черными шипами; послѣдній суставъ лапокъ вмѣстѣ съ когтями черного цвѣта. Хоботокъ весь темнобурый. Дл. 3 мм.

*Psallus cognatus* n. sp.

Kopf, Vordertheil des Pronotum und Schild-