

schmal, blattartig, nur mit einer Reihe kleiner Maschen. Die Rippen und Pronotumkiele schwarz kleinfleckig. Ein Fleck in der Randmitte der Decken und die Randpunkte schwarz. Mittelfeld bisweilen bräunlich. L. $2\frac{1}{2}$ mm.

Относится къ подроду *Platychila* Fieb. Переднеспинка, грудь и надкрылья — грязного желтоватобѣлаго цвѣта; вся поверхность покрыта рѣдкими, но сильными стоячими щетинками; кромѣ того нѣкоторыя части, особенно голова и грудь, покрыты, въ видѣ пыли, мельчайшими бѣловатыми волосками. Усики и ноги рыжеватые, длинноволосистые, послѣдній суставъ усиковъ и когти на ногахъ черного цвѣта. Шейный пузырь полукруглой формы, спереди прямо обрѣзанъ. Боковые края переднеспинки узкіе, листоватые, въ одинъ рядъ вѣточекъ, нѣсколько приподнятые къ верху и почти прямые, съ широкоокругленными плечевыми углами; реберъ переднеспинки три, довольно высокихъ, параллельныхъ, среднее изъ нихъ проходить и по шейному пузырю, боковые впереди нѣсколько загнуты внутрь. Надкрылья овальной формы, съ узкой перепонкой; крайнее поле широкое, изъ двухъ рядовъ крупныхъ вѣточекъ. На ребрахъ переднеспинки и надкрыльевъ, а также по краямъ ихъ, находится нѣсколько черныхъ точекъ; на срединѣ крайняго поля надкрыльевъ черное пятно, образованное изъ черныхъ реберъ и ихъ анастомозовъ, центры же вѣточекъ, ограниченные этими ребрами, остаются свѣтлыми. Внутреннее поле надкрыльевъ иногда буроватое. Брюшко темнобурое. Дл. $2\frac{1}{2}$ мм., ширина брюшка $1\frac{1}{2}$ мм.

43. *Orthops pilosulus* n. sp. Ganz orangeroth, fein weisslich behaart und dicht punctirt. Kopf glatt, glänzend, Querleiste im Nacken stark, weiss. Schnabelwurzel röthlich, Endglied braun. Fühler orange gelb, Glied 3 und 4 fein bräunlich. Schild weiss, am Grunde orangeroth. Clavus, Cuneus in der Mitte und eine breite Binde am Ende des Corium orangeroth. Membran hell, durchsichtig, irisirend. Beine gelblich, Hinterschenkelende