

roth, Schienbeindornen gelb. Klauenglied am Ende, Klauen und Mittelbrust schwarz. L. 4 mm.

Преобладающій цвѣтъ всего насѣкомаго оранжевокрасный; туловище сверху и снизу покрыто весьма нѣжными свѣтлыми волосками. Переднеспинка, щитокъ и надкрылья, особенно послѣднiя, покрыты частымъ и глубокимъ пунктиромъ, только на синеус точки нѣжныѣ. Перепонка свѣтлая, прозрачная, сильно опализирующая.

Голова гладкая, блестящая, красноватооранжеваго цвѣта; при этомъ можно замѣтить, что красный пигментъ располагается болѣе или менѣе правильными поперечными полосками въ два ряда, идущими вдоль всей поверхности головы; затылочный кантикъ между глазами сильный, почти бѣлаго цвѣта. Глаза крупныя, темновисневаго, почти чернаго цвѣта. Хоботокъ оранжевый, первый суставъ у основанiя красноватый, послѣднiй на концѣ бурый. Усики однообразнаго желтоватооранжеваго цвѣта, послѣднiе два сустава съ буроватымъ оттѣнкомъ; переднеспинка оранжеваго цвѣта, края ея, особенно же переднiй — красноватые; переднiй кантъ бѣлаго цвѣта. Щитокъ бѣлый, съ большимъ основнымъ треугольнымъ пятномъ оранжевокраснаго цвѣта; весь clavus, кромѣ конца, широкая поперечная полоса въ задней половинѣ ихъ, а также середина синеус оранжевокраснаго цвѣта. Брюшко сверху и снизу и конецъ бѣдръ задней пары ногъ — такого же цвѣта, но болѣе слабого оттѣнка. Среднегрудь чернаго цвѣта. Ноги желтоватые, равно какъ и шишки покрывающiе голени. Конецъ когтеваго сустава и самыя когти — чернаго цвѣта. Дл. около 4 мм. (♂).

46. *Halticus consimilis* n. sp. Ganz schwarz, oben dicht goldgelb behaart. Pronotum und Schild sehr fein runzelig, Halbedecken stärker punctirt. Fühler, Schenkelende, Schienbeine und Füße gelblich. Fühlerwurzel am Grunde, Glied 2 oben, Glied 3 und 4 ganz dunkelbraun. Schienbeinende und Klauenglied bräunlich. Kopf schmal, convex. L. 2½ mm. (♂).