

## ПОЛУЖЕСТБОКРЫЛЫЯ (НЕМІРТЕРА НЕТЕРОПТЕРА) СЪВЕРНОЙ ПЕРСІИ.

В. Е. ЯКОВЛЕВА.

Во время своихъ путешествій по съверной Персіи Г. Ф. Христоффъ собралъ, между прочимъ, небольшую коллекцію полу же стбокрылыхъ, которую передалъ для определенія и описанія мнѣ. Кромѣ того, чрезъ посредство Русскаго Энтомологическаго Общества, я получилъ нѣсколько экземпляровъ изъ той же мѣстности, собранныхъ членомъ Русскаго Географического Общества Огородниковымъ; впрочемъ, между послѣдними не оказалось ни одного вида, котораго не было бы найдено Христоффомъ.

Въ коллекціи преобладаютъ виды, принадлежащіе къ семействамъ съ крупными формами, представителей же *microhemiptera*, какъ-то: *Capsidae*, *Tingitidae*, *Anthocoridae*, очень мало. Это объясняется тѣмъ, что собирали, какъ неинтересующіеся специально этимъ отрядомъ насѣкомыхъ, обращали свое вниманіе лишь на болѣе крупныя и красивыя формы и то въ такомъ только случаѣ, если онѣ сами попадались подъ руку; мелочь же совершенно игнорировалась ими.

При такомъ случайному характерѣ коллекціи, не можетъ быть и рѣчи о какихънибудь сравненіяхъ и обобщеніяхъ; можно только замѣтить, что число новыхъ видовъ, сравнительно съ общимъ количествомъ найденныхъ полу же стбокрылыхъ, довольно значительно: оно составляетъ третью часть всей коллекціи, именно 23 вида, остальная двѣ трети относятся преимущественно къ формамъ южноевропейскимъ; кромѣ того, между ними оказалось два вида, описанныхъ ранѣе В. Е. Ошанинымъ изъ Самарканда и Заравшанской долины.

СПИСОКЪ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХЪ СЪВЕРНОЙ  
ПЕРСИИ.

Fam. Pentatomidae.

Subf. Scutellerini.

1. *Sphenaspis* (nov. gen.) *curculionoides* n. sp. Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Шахруда.
2. *Polyphyma* (nov. gen.) *scrobiculata* n. sp. Тоже.
3. *Trigonosoma Putoni* n. sp. Нѣсколько экземпляровъ изъ той же мѣстности.
4. *Tholagmus flavolineatus* Fa b. Астрabadъ.

Subf. Cydnini.

5. *Sehirus dubius* Scop. Общеевропейскій видъ, найденный въ одномъ экземплярѣ около Гаджіабада.
6. *Gnathoconus validus* n. sp. Одинъ экземпляръ около Шаку.

Subf. Pentatomini.

7. *Menaccarus divaricatus* n. sp. Одинъ экземпляръ около Шахруда.
8. *Sciocoris arenicolus* Schltz. Тоже.
9. *Mustha spinulosa* Lef. Два экземпляра изъ той же мѣстности, ростомъ нѣсколько меньше кавказскихъ.
10. *M. dentata* n. sp. Повидимому нерѣдокъ, такъ какъ найденъ былъ въ достаточномъ количествѣ какъ Христофонъ, такъ и Огородниковъ.
11. *Apodiphyia amygdali* Germ. Замѣченъ былъ въ разныхъ мѣстахъ; видъ вѣроятно не особенно тамъ рѣдкій.
12. *Eusarcoris inconspicuus*, H. S. (*E. pseudoaeneus* Jak.). Найденъ былъ около Астрабада въ нѣсколькихъ экземплярахъ.

Видъ весьма обыкновенный по съверному и западному берегамъ Каспійскаго моря.

13. *Staria lunata* Hahn. Одинъ экземпляръ около Астрабада.

14. *Gomphocranum* (nov. gen.) *Christophi* n. sp. Нѣсколько экземпляровъ около Шахруда.

15. *Peribalus vernalis* Wlff. Тоже.

16. *Poecilocoris* (nov. gen.) *scitulus* n. sp. Шахрудъ, два экземпляра.

17. *Negara smaragdula* Fab. Нѣсколько экземпляровъ, изъ Астрабада и Гызы.

18. *Pierodorus DeGeeri* Fieb. Астрабадъ.

19. *Rhapigaster griseus* Fab. Тоже.

20. *Strachia decorata* H. S. Астрабадъ и Шаку.

21. *S. dominula* Harr., var. *caucasica* Jak. Одинъ экземпляръ изъ Шаку; эта разновидность встрѣчается также около Дербента.

22. *S. Putoni* n. sp. Изъ Шахруда и другихъ мѣстностей, въ довольно большомъ количествѣ экземпляровъ, собранныхъ гг. Христофомъ и Огородниковымъ.

23. *S. adusta* n. sp. Только одна самка, изъ Шахруда.

24. *Barbiger* (nov. gen.) *furvus* n. sp. Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Таша.

25. *B. Saundersi* n. sp. Четыре экземпляра изъ той же мѣстности.

26. *Acanthosoma haemorrhoidalis* L. Астрабадъ. Форма среднеевропейская, встрѣчающаяся на Кавказѣ только на горахъ.

#### Fam. Coreidae.

27. *Ceraleptus gracilicornis* H.S. Астрабадъ. Видъ не рѣдкій на Кавказѣ.

28. *Camptopus tragacanthae* Klti. Нерѣдокъ въ окрестностяхъ Шаку и Шахруда.

29. *Alydus calcaratus* L. Шахр. Форма общеевропейская.
30. *Stenocephalus albumarginatus* n. sp. Только один экземпляр, изъ Шахруда.
31. *Terapha hyosciami* L. Рыжая разновидность, около Шахруда, нерѣдка.

Fam. Lygaeidae.

32. *Lygaeus equestris* L. Шахрудъ.
33. *L. militaris* Fab. Изъ той же мѣстности.
34. *L. saxatilis* Scop. Тоже.
35. *Peritrechus puncticeps* Thoms. Одинъ экземпляръ изъ Астрабада. Видъ общеевропейскій.
36. *P. flavigornis* n. sp. Шахрудъ, въ одномъ экземпляре.
37. *Pachymerus pedestris* Pz. Астрабадъ—нерѣдко.
38. *P. (Beosus) luridus* n. sp. Шахрудъ, одинъ экземпляръ.

Fam. Tingitidae.

39. *Monanthis ovatula* n. sp. Нѣсколько экземпляровъ изъ Шахруда.

Fam. Capsidae.

40. *Miris virens* L. Шахрудъ.
  41. *Pantilius tunicatus* Fab. Тоже.
  42. *Rusopterna persica* Reut. (Pt. Nouv. Entoml. 1876. № 140). Тоже.
  43. *Orthops pilosulus* n. sp. Тоже.
  44. *Camplobrochis punctulatus* Fall. Ташъ.
  45. *C. lutescens* Schill. Гязъ.
  46. *Halticus consimilis* n. sp. Астрабадъ.
  47. *Harpocera thoracica* Fall. Ташъ.
  48. *Agaliastes verbasci* HS. (?) Шахрудъ.
- Всѣ эти виды, кромѣ *C. punctulatus* Fall., были собраны только по одному экземпляру.

Fam. Anthocoridae.

49. *Tetraphleps pilosus* n. sp. Шахрудъ, одинъ экземпляръ. Этотъ же видъ найденъ Беквромъ, на кавказскихъ горахъ, около аула Ахтъ, гдѣ онъ держится на хмелѣ.

Fam. Reduviidae.

50. *Nabis viridulus* Spin. Въ съверной Персіи, на *Tamarix*.

51. *Harpactor iracundus* Scop. Астрabadъ. Обыкновенъ также на Кавказѣ и по всей южной Европѣ.

52. *H. monticola* Oschn. Нѣсколько экземпляровъ изъ Гадшабада и Шаку. Въ первый разъ описанъ Ошанинымъ изъ Самарканда.

53. *H. persicus* n. sp. Три экземпляра изъ Шахруда.

54. *H. rutilus* n. sp. Тоже.

55. *H. morio* Klti. Гъязъ. Шахрудъ. Повидимому не рѣдокъ.

56. *H. Christophi* n. sp. Шахрудъ. Видъ, вѣроятно, довольно обыкновенный въ съверной Персіи, такъ какъ былъ собранъ во многихъ экземплярахъ какъ Христофомъ, такъ и Огородниковымъ.

57. *Holotrichius maurus* H.S. Шахрудъ, одинъ экземпляръ.

58. *Reduvius testaceus* H.S. Астрabadъ.

59. *R. Fedtschenkiamus* Oschn. Въ Шахрудѣ находилъ его часто Христофъ, въ другихъ мѣстностяхъ — Огородниковъ. Въ первый разъ открытъ былъ А. П. Федченко — въ Самарканѣ.

60. *Centroscelis spinosus* Jak. Шахрудъ, одинъ экземпляръ. Видъ обыкновенный по берегамъ каспійскаго моря, такъ какъ кромѣ Персіи, Кавказа и Астраханской губерніи, былъ замѣченъ также въ Красноводскѣ и на полуостровѣ Мантышлакѣ.

Fam. Notonectidae.

61. *Notonecta glauca* L. Гаджіабадъ, — въ одномъ экземпляре.

## ОПИСАНИЕ НОВЫХЪ РОДОВЪ И ВИДОВЪ.

*Sphenaspis* n. gen. Körper länglich, ziemlich schmal, sehr dicht filzig behaart, unterseits hochgewölbt. Kopf länglich, vorn verschmälert, Stirnschwiele sehr dick, durchlaufend. Wangenplatten breit, oval. Fühlerglieder länglich, Glied 1 und 2 gleichlang, Glied 3 kürzer als 2, Glied 4 kaum länger als 2, Endglied so lang als Glied 2 und 3 zusammen. Schnabel an das Hinterbrustende reichend. Pronotum sechseckig, Seiten gerade, Schulterecken abgerundet. Pronotum und Schild leicht gewölbt, eben, grob punctirt. Schild den ganzen Rücken deckend, nur der Grund des Corium frei, — länglich, schmal, keilförmig. Beine einfach, ohne Stacheln. Hinterschienen am Grunde verdickt.

Туловище длинное, довольно узкое, снизу сильнѣе выпуклое, чѣмъ сверху. Голова длинная, къ переду съуженная, съ открытымъ, очень толстымъ, концомъ носа; склериты пластинки въ видѣ большихъ овальныхъ лопастей. Усики довольно длинные, первый и второй суставы ихъ равной длины, третій едва короче втораго, четвертый же нѣсколько длиннѣе, пятый суставъ равенъ второму и третьему вмѣстѣ взятымъ. Хоботокъ достигаетъ до конца груди. Переднеспинка почти шестиугольная, передний и боковые края ея прямые, задній едва выгнутый. Щитокъ длинный, узкий, достигающій конца брюшка. Поверхность, какъ переднеспинки, такъ и щитка ровная, слабо выпуклая, безъ всякихъ углубленій и бороздокъ. Ноги гладкія, безъ шипиковъ; голени задней пары у основанія толще, къ концу постепенно утончаются.

1. *S. curculionoides* n. sp. Schwarz, oben grob punctirt und beiderseits sehr dicht silberweiss filzig behaart. Pronotum und Schild mit gelber durchlaufender Mittellinie. Pronotumseiten und Coriumgrund orangegelb. Schild bräunlichgelb; vier Streifen und Rand schwärzlichbraun. Fühler und Schnabel röthlichgelb. Beine schwarz, Fussglieder braun. L. 7 mm.

Голова, туловище и ноги чернаго цвѣта, щитокъ буровато-желтый; боковые края переднеспинки, основаніе надкрыльевъ и продольная линія переднеспинки и щитка желтоватооранжевые; на переднеспинкѣ раскинуто нѣсколько такого же цвѣта пятнышекъ; она и щитокъ грубо пунктированы, на свѣтломъ фонѣ пунктиръ черный. Края щитка темно-бураго цвѣта, вдоль его проходитъ до четырехъ полосъ такого же цвѣта. Лапки бураго цвѣта, хоботокъ и усики свѣтло-рыжие. Все насѣкомое сверху и снизу, неисключая ногъ, очень густо одѣто, весьма короткими серебристо-блѣлыми волосками, въ видѣ войлока, такъ что туловище кажется сѣровато-блѣлымъ и подъ этимъ покровомъ (если онъ не стѣртъ) невозможно отличить ни цвѣта, ни пунктира. Дл. 7 мм., шир. туловища около 3 мм.

*Polyphyma n. gen.* Körper breit oval, fast viereckig, oben sehr gewölbt. Kopf fast vertical, Stirnschwiele durchlaufend. Augen klein, etwa stieförmig. Fühler sehr dünn, Wurzelglied länger als Glied 2, Glied 2, 3 und 4 gleichlang, Endglied das längste, so lang als Glied 3 und 4 zusammen. Wangenplatten leistig. Pronotumseiten breitgerundet. Vorderbrust mit lappenförmiger Erweiterung (Halskragen). Schild breit oval, stumpfabgerundet, gewölbt, hinter dem Buckel sehr abgedacht. Beine kurz, dick. Hinterfusswurzel so lang als Glied 2 und 3 zusammen.

Туловище широко овальное, почти четырехугольное, снизу совершенно плоское, сверху сильно выпуклое. Голова почти вертикальная, небольшая, треугольная съ открытымъ концомъ носа; она развита болѣе въ ширину, чѣмъ въ длину. Глаза небольшіе, плотно прилегающіе къ переднеспинкѣ; передъ глазами такая сильная, прямоугольная выемка, что глаза кажутся сидящими на широкихъ стебелькахъ. Усики очень тонкіе, нѣжные; первый суставъ ихъ, расширенный къ вершинѣ, недостигаетъ конца головы и въ три или четыре раза ея короче, суставы 2, 3 и 4 почти одинаковой длины, каждый изъ нихъ короче первого, пятый равенъ двумъ предыдущимъ взятымъ вмѣстѣ. Скуловыя пластинки узкія, во всю длину головы. Переднеспинка

очень выпуклая, передняя ея часть постепенно загибается книзу; боковые края широкие, округленные, также какъ и плечевой уголъ; задній край почти прямой, а передній полого вырѣзанъ. Переднегрудь съ сильными лопастями. Вдоль головы, переднеспинки и щитка идетъ высокое ребро. Щитокъ короткий, широко округленный. Основаніе надкрыльевъ широко выставляется изъ подъ щитка, въ видѣ тупаго угла. Щитокъ сильно выпуклъ, въ видѣ крыши, которая очень круто спускается назади и болѣе полого къ бокамъ. Ноги короткія, сильные; послѣдній суставъ лапокъ равенъ длиною прочимъ двумъ вмѣстѣ взятымъ; когти простые, безъ отростковъ (arolia). Родъ этотъ долженъ стоять рядомъ съ *Psacasta*.

2. *P. scrobiculata* n. sp. Ganz lehmgelb, oben fein, zerstreut, unten grob schwarz-punctirt. Kopf glatt, Pronotum und Schild uneben, knollig. Kopf, Pronotum und Schild mit durchlaufendem Mittelkiele. Pronotummitte querüber eingedrückt und gekielt. Schienbeine an der oberen Kante stumpf sägeähnig. L.  $7\frac{1}{2}$  mm.

Весь глинисто-желтаго цвѣта, сверху мелко пунктированный; мѣстами пунктиръ чернаго цвѣта. Снизу брюшко и части груди покрыты рѣдкимъ, но крупнымъ пунктиромъ, точки котораго черныя. Усики одноцвѣтныя, только первый суставъ у основанія и къ вершинѣ нѣсколько темнѣе. Голова гладкая, слабо пунктированная. Переднеспинка и особенно щитокъ имѣютъ поверхность сильно бугристую. Поперѣгъ переднеспинки идетъ сильное ребро, впереди котораго находится два, а сзади четыре углубленія буроватаго цвѣта, покрытыя чернымъ пунктиромъ; боковые края округленные, выпуклые, гладкие. Щитокъ у основанія имѣеть четыре бугорка, углубленія между которыми выполнены черными точками. Connexivum значительно выдается изъ подъ щитка, края каждого сегмента округленные, сверху выпуклые, въ видѣ подушечекъ. Ноги такого же цвѣта, какъ и все туловище, покрытыя, кроме лапокъ, крупными черными точками. Наружный край голеней усаженъ

посредствомъ мелкихъ морщиноекъ. У *T. falcata* ширина туловища между концами плечевыхъ отростковъ равняется 8 мм. при длине въ 8 же мм.

6. *Gnathoconus validus* n. sp. Schwarz, grob punctirt. Schulterecke des Pronotum weisslich. Coriumgrund und Rand — weiss. Membran bleich. Fühler schwarz, Glied 1 und 2 röthlichbraun. Beine braun, Dorne schwarz. L. 6 mm.

Очень похожъ на *G. albomarginatus* Fab., но гораздо крупнѣе и покрытъ болѣе грубымъ пунктиромъ. Весь черный; глубокія точки пунктира всюду одинаковой величины, только на серединѣ переднеспинки онѣ замѣтно сильнѣе. Плечевой уголъ бѣловатый; широкая полоса надкрыльевъ у основанія бѣлая, далѣе до конца идетъ узкая бѣлая оторочка. Мембранальный шовъ прямой; перепонка свѣтлая. Усики черные, первые два сустава красновато-бурые; ноги бурыя, съ черными шипами. Дл. 6 мм.

7. *Menaccarus divaricatus* n. sp. Breit oval, graugelb; Pronotum und Schild am Grunde gelbbraun. Rand des Kopfes, des Pronotum und des Corium am Grunde schwarzborstig. Kopf breit, vorn verengt. Fühler zerstreut schwarzbeborstet, Glied 2 mehr als doppelt langer als 1. Pronotumseiten breit gelblichweiss, farblos punctirt, Schild mit einem Mittelkiel. Schenkel unten und Schienbeine schwarz bedornt. Hinterfusswurzel doppelt langer als Glied 2 und 3 zusammen. L. 6 mm.

Широкой овальной формы; сѣроватожелтаго цвѣта, кромѣ переднеспинки и основанія щитка, которая рыжеватобурыя. Наружные края головы, переднеспинки и основанія надкрыльевъ усажены длинными черными щетинками; кромѣ того на поверхности головы раскидано нѣсколько щетинокъ, которая скучены болѣе всего у конца носа. Голова широкая, почти полу круглая, къ переду съуженная; край головного щитка образуетъ передъ глазами тупой зубецъ. Усики свѣтло-буроватые, покрыты рѣдкими и тонкими щетинками; основные суставы ихъ бѣловатые; второй суставъ очень длинный, болѣе чѣмъ вдвое

длиннѣе перваго. Голова покрыта пунктиромъ, точки котораго рѣдко раскиданы, затылокъ же и передній край головы гладкіе. На затылкѣ два темнобурыхъ треугольныхъ пятна; скопленіе точекъ образуетъ кромѣ того нѣсколько небольшихъ пятенъ, напр., около конца носа и на краю головнаго щитка. Боковыя стороны переднеспинки широкія, бѣловато-желтые, почти гладкія, или изрѣдка покрытыя безцвѣтными и неглубокими точками; такая же свѣтлая, гладкая полоска окаймляетъ задній край переднеспинки. Шейный уголъ снаружи широко округленный; свѣтлый край переднеспинки ограниченъ изнутри полоской изъ черныхъ, крупныхъ точекъ, которая тянется, иногда перерываясь по срединѣ, отъ переднаго края до плечеваго возвышенія; пунктиръ срединной части переднеспинки очень нѣжный и точки его мѣстами рѣдко раскиданы, мѣстами же, какъ напр. на переднемъ краѣ, группируются въ небольшія пятна. Вдоль преднеспинки замѣтна свѣтлая полоска, которая переходитъ и на затылокъ. Щитокъ широкій, языкообразный, съ прямыми краями; онъ длиннѣе надкрыльевъ и по срединѣ образуетъ продольное возвышенное ребро, съуживающееся къ концу, до котораго нѣсколько не доходитъ. Передняя часть щитка нѣсколько возвысѣна; въ углахъ же его находится по гладкому, продолговатому бугорку, ограниченному снаружи черной полоской, а изнутри темнымъ пятномъ. Рядъ темныхъ пятенъ лежитъ по бокамъ возвышенного ребра, одно пятно кромѣ того находится на концѣ щитка; всѣ эти пятна образованы изъ скопленія чернаго пунктира, точки котораго въ основной части щитка гораздо крупнѣе, чѣмъ въ конечной. Узкіе края щитка свѣтлые, гладкіе. Надкрылья короче щитка, прямо обрѣзаны и у основанія расширены. Широкій наружный край ихъ, до главнаго ребра, покрытъ очень нѣжнымъ буроватымъ пунктиромъ, только передъ мембраннымъ швомъ замѣчаются болѣе крупные точки; всѣ ребра надкрыльевъ и ихъ анастомозы гладкія, широкія, пространство между ними покрыто крупными, черными

точками, мѣстами сгущающимися въ черные пятна, какъ напр. во всей задней половинѣ надкрыльевъ. Перепонка короче брюшка ( $\text{♀}$ ), свѣтлосѣроватая, съ бурыми ребрами и пятнами, раскиданными, между ними. Connexivum далеко выдается изъ подъ надкрыльевъ; въ углахъ сегментовъ и по окраинѣ ихъ черные пятна и полоски, средина же покрыта безцвѣтными точками. Голени покрыты черными шипами, а бедра съ нижней стороны длинными черными же щетинками. Первый суставъ лапокъ задней пары ногъ вдвое длиннѣе остальныхъ двухъ суставовъ вмѣстѣ взятыхъ. Ноги бѣловатыя, послѣдній суставъ лапокъ буроватый. Дл. ( $\text{♀}$ ) 6 мм., ширина у основанія надкрыльевъ 4 мм. — Самецъ неизвѣстенъ.

Видъ этотъ похожъ на *M. arenicolus* Schltz, отличаясь отъ него формой головнаго щитка, съуженнаго къ переду (у *M. arenicolus* — щитокъ этотъ полукруглый), формой и пунктирюкой надкрыльевъ, широкимъ ребромъ на щиткѣ и многими другими признаками. Очень характернымъ отличиемъ можетъ служить, между прочимъ, длина первого сустава заднихъ лапокъ, который у *M. arenicolus* равенъ длини двухъ остальныхъ суставовъ, а у описываемаго вида — вдвое ихъ длиннѣе; кроме того, второй суставъ усиковъ у *M. arenicolus* равенъ длиною первому, тогда какъ у *M. divaricatus* второй суставъ болѣе чѣмъ вдвое длиннѣе первого.

10. *Mustha dentata* n. sp. T. II фиг. 1. Schwarz, matt, sehr dicht gelb, kraus behaart. Kopf, Pronotum, Corium und Bauchrand — sägezähnig. Schnabel kurz, an das Hinterbrustende reichend. Pronotum länglich, vorn verschmäler. Schildende spitz, schmal, weiss. Corium und Schild mit zerstreuten, röthlichgelben Puncten. Beine schwarzbraun, dicht gelb behaart und schwarz bewimpert. L. 17—21 mm.

Весь черный, матовый, густо покрытый сверху и снизу короткими, курчавыми, желтоватыми волосками. Боковые края головы, переднеспинки, основанія надкрыльевъ и брюшка усажены тонкими зубчиками, которые всего сильнѣе развиты на

переднеспинкѣ и головѣ; въ промежуткахъ между крупными зубчиками сидятъ мелкие; кроме того основаніе зубчиковъ покрыты тонкими черными щетинками. Продольная полоска среди головы гладкая, безволосая. На затылкѣ находится рыжѣе пятнышко, такія же, но мало замѣтныя подъ волосами, пятнышки (въ видѣ точекъ) изрѣдка раскиданы на надкрыльяхъ и щитѣ. Конецъ щитка узкій, заостренный, бѣлаго цвѣта, покрытый безцвѣтнымъ пунктиромъ. Connexivum одноцвѣтный, густо-волосистый; края его сильно приподняты вверху. Ноги сильные, буровато-черныя, густо покрыты желтоватыми волосками и короткими черными же щетинками. Суставы усиковъ короче, у другихъ видовъ, первые три сустава покрыты черными щетинками. Хоботокъ чернаго цвѣта, короткій едва достигающій конца заднегруди. Переднеспинка значительно съуженная къ переду. Дл. 17 — 21 мм.

Отъ другихъ видовъ *Mustha* отличается, кромѣ однообразнаго чернаго цвѣта и густаго волосистаго покрова, главнымъ образомъ, укороченностью хоботка, который у *M. dentata* едва достигаетъ до конца груди, тогда какъ у *M. serrata* и *M. spinosa* онъ хватаетъ до третьаго брюшнаго кольца. Усики у *M. dentata*, хотя сохраняютъ относительную длину суставовъ, но также короче чѣмъ у прочихъ видовъ. Остальные признаки, какъ-то: удлиненная и съуженная напереди переднеспинка, завороченный вверхъ край connexivum, форма зубчиковъ — не менѣе характерны для описываемаго вида.

**Gomphocranum n. gen.** Oval. Kopf fast vertical, keilförmig. Jochstücke lang, lanzettlich. Wangenplatten vorn spitzekig, hinten lappenförmig erweitert und fein gezähnelt. Fühlerwurzel viel kürzer als der Kopf, Glied 2 fast doppelt so lang als 1, Glied 5 das längste. Schnabel schlankgliederig, an das Ende der Hinterbrust reichend; Wurzelglied fast so lang als der Kopf. Pronotum vorn verengt, Seiten gerade, Schulterecke zugerundet, wulstig. Halsecke mit einem kleinem Zahn. Schild

breit, zungenförmig. Membran mit 8—9 Rippen. Hinterleib gewölbt. Beine unbewehrt, Füsse dünn, Hinterfusswurzel so lang als Glied 3, und doppelt länger als 2.

Туловище овальное, довольно широкое. Голова почти вертикальная, длинная и узкая. Конец носа гораздо короче склеритовъ отростковъ, которые сильно вытянуты впередъ и образуютъ заостренныя на концѣ лопасти. Наружные края головы, передъ глазами, образуютъ пологую выемку. Вообще голова р. *Gomphoscratium* похожа на голову р. *Rubiconia*, только у послѣдняго она очень широкая и укороченная, а у описываемаго рода — вытянутая и узкая; другими словами, ширина ея у *Rubiconia* равна или даже нѣсколько больше ея длины, а у *Gomphoscratium* — длина головы превосходитъ въ полтора раза ея ширину. Bucculae широкія, напереди почти прямо обрѣзанныя и оканчиваются зубцомъ, назади же образуютъ большую лопасть, въ видѣ языка. Всѣ края bucculae неровные, съ неправильными тупыми зубчиками. Усики нѣсколько длиннѣе головы и переднеспинки взятыхъ вмѣстѣ; первый суставъ болѣе чѣмъ вдвое короче головы и далеко не хватаетъ до ея конца, второй суставъ очень тонкій, въ полтора раза длиннѣе первого; начиная со втораго, суставы постепенно увеличиваются въ длину, такъ что самый длинный — пятый. Хоботокъ незначительной толщины и достигаетъ до начала брюшка, первый суставъ его почти равенъ длини головы. Глаза пыпуклы, почти полушаровидной формы. Переднеспинка нѣсколько длиннѣе головы, къ переду сильно съуженная и довольно глубоко вырѣзанная; боковые стороны до плечевыхъ угловъ почти прямые; послѣдніе округленные и слабо выпуклые; сзади передъ щиткомъ прямо обрѣзанная. Шейный уголъ оканчивается маленькимъ зубчикомъ. Щитокъ широкій, въ видѣ языка; боковые края его по срединѣ слегка вырѣзаны и нѣсколько длиннѣе его основанія. Перепонка съ 8—9 ребрами. Брюшко широкое, вѣдающееся изъ подъ надкрыльевъ, снизу выпуклое. Вдоль

средины груди идетъ продольное ребро. Ноги не вооруженные; лапки тонкія, первый суставъ ихъ вдвое длиннѣе втораго и ровенъ третьему.

14. *G. Christophi* n. sp. Ganz graubraun, Kopf und Hinterleib zuweilen röthlichbraun, kahl, grob schwarz-punctirt. Fühler gelblich, Glied 3 und 4 bräunlich. Rücken und Rand des Kopfes schwarz; Pronotumseiten, Rand des Corium am Grunde, Schildspitze, Bauchrand und Spiracula gelblichweiss, Schild dichter punctirt, am Grunde drei Flecke weisslich. Beine gleich bräunlichgelb, gleichmässig schwarz-punctirt. Klauen am Ende schwarz. L. 7—8 mm.

Однообразнаго буровато-сѣраго цвѣта, брюшко снизу, а иногда и голова съ красно-бурымъ оттѣнкомъ. Все тулowiще безводосое, сверху покрытое крупнымъ пунктиромъ, также какъ голова снизу и грудь; точки черныя, несливающіяся; въ задней части щитка овѣ расположены нѣсколько гуще. Брюшко покрыто нѣжными черными точками. Усики желтоватые, по слѣдпіе два сустава буроватые, узкие боковые края головы — чернаго цвѣта; по боковымъ краямъ переднеспинки идутъ гладкія ребра бѣлаго цвѣта; наружные края надкрыльевъ у основанія и оторочка кругомъ щитка, въ задней его половинѣ, края брюшка, а также дыхальца желтовато-бѣлые. Въ углахъ щитка и у его основанія замѣтны бѣловатыя гладкія возвышенія. Ноги блѣдно буровато-желтые, покрытыя черными точками, кроме лапокъ. Брюшко сверху и когти на концѣ черныя. Дл. 7—8 мм.

*Poecilocoris* n. gen. Körper lânglich-oval, kahl. Kopf dick, dreieckig; Stirnschwiele durchlaufend; Augen gross, halbkugelig, vorstehend. Fühler dünnligierig; Wurzelglied kürzer als der Kopf, Glied 2 dreimal länger als 1 und fast so lang als 4, Glied 3 und 5 jedes um  $\frac{1}{4}$  kürzer als 2. Schnabel lang, fast auf die zweite Bauchschiene reichend, Wurzelglied so lang als der Kopf. Wangenplatten gerade, linienförmig. Mittelbrust mit starkem Kiel. Pronotumseiten geschweift; Schulterecke

breit, leicht aufgebogen, stumpfspitzig; Vorderrand gerade. Schild fast über  $\frac{2}{3}$  länger als das Pronotum, in dem Grundwinkel ein lichter callöser Höcker. Coriumecke ausgeschnitten. Membran hell durchscheinend, mit 8 Rippen. Bauch unten gewölbt. Beine ziemlich dünn, Hinterfusswurzel so lang als Glied 2 und 3 zusammen.

Туловище продолговато-овальное, совершенно лишенное волосъ. Голова треугольная, съ очень большими, сильно выпуклыми глазами; конецъ носа свободный, оканчивающійся направлѣньемъ съ скапывальными отростками, которые къ переду сильно сужены, а съ боковъ выпуклы. Первый суставъ усиковъ очень короткій, недостигающій конца носа и вчетверо короче головы, второй суставъ втрое длиннѣе первого, третій и пятый каждый на  $\frac{1}{4}$  короче втораго, а четвертый немного его короче; вообще усики очень тонкіе, въ особенности суставы второй и третій. Хоботокъ тонкій достигающій до половины первого брюшного кольца; первый суставъ его равенъ длиною головы, второй — сплюснутый съ боковъ — длиннѣе всѣхъ прочихъ и въ полтора раза длиннѣе первого. Бугорокъ на которомъ сидятъ усики имѣть съ вѣнчанной стороны очень короткій и тупой зубчикъ. Глаза полушаровидной формы и значительно выдаются передъ шейными углами переднеспинки; простые глаза (*ocelli*) также сильно развиты и сидятъ очень близко къ сложнымъ, по бокамъ затылка. Скуловыя пластники прямые, линейныя, простирающіяся вдоль всей головы снизу. Переднеспинка шестиугольная, сильно суженная къ переду, съ выдающимися плечевыми углами; передній и задній края ея почти прямые, боковые — сильно вырѣзаны передъ плечевыми углами, которые вытануты въ тупое остріе и слегка приподняты къ верху. Щитокъ длинный и значительно суженный въ послѣдней своей половинѣ, достигаетъ до переднаго края четвертаго брюшного кольца, а вѣнчаній уголъ сорium до половины этого же кольца. Въ основныхъ углахъ щитка находится по голому, возвышенному бугорку, боковые края его въ основной половинѣ вы-

пуклые. Мембранный шовъ у виѣшняго угла corium'а имѣеть полуокруглую вырѣзку, далѣе же къ серединѣ слегка выдается въ видѣ лопасти. Перенонка выдающаяся надъ брюшкомъ, совершенно прозрачная, стекловидная, съ 8 ребрами, изъ которыхъ немногія развѣтвляются иногда на два отростка; вдоль мембранныаго шва помѣщается длинная поперечная клѣтка, которая даетъ начало всѣмъ продольнымъ ребрамъ, вромъ виѣшняго. Края брюшка у ♀ значительно выдаются изъ подъ надкрыльевъ; брюшко снизу выпуклое. Вдоль среднегруди идетъ возвышенное ребро. Ноги довольно тонкія, голени задней пары слегка искривленныя; первый суставъ лапокъ этой же пары толще прочихъ суставовъ и по длине равенъ двумъ послѣднимъ взятымъ вмѣстѣ.

Родъ этотъ долженъ стоять послѣ *Eusarcoris*.

16. *P. scitulus* n. sp. T. II фиг. 2. Bleich graugr n, dicht fein punctirt; Unterseite weiss marmorirt. F hler br nlichgr n, Glied 3 und 4 br nlich. Hintertheil des Pronotum bleich br nlich, Schulterecke r thlichbraun; Pronotumbuckel glatt, weisslich. Schild gr nlich, Spitze gelbweiss, am Grunde drei Flecke weiss. Halbdecken grob punctirt, am Grunde und Ende gr nlich, Mittelfeld r thlichbraun, Randfeld und ein Fleck vor der Mitte des Corium weiss. R cken schwarz, Connexivum gr nlich, mit weisslichem Mittelquerfleck, Randlinie rostr thlich. L.  $8\frac{1}{2}$ —10 mm.

Блѣднаго буроватозеленаго цвѣта; глаза свѣтлобурье, простые глазки — винно-желтаго цвѣта. Усики зеленоватобурье, послѣдніе два сустава темнѣе. Хоботокъ блѣдно буроватожелтый, конецъ послѣднаго сустава темнобурый. Задняя часть переднеспинки блѣдно буроватая, плечевые углы оранжевобурье, парные же голые бугорки находящіеся въ передней части переднеспинки — бѣловатые. Щитокъ зеленоватый, конецъ его бѣловатый, безъ точекъ, съ оранжевобурымъ остриемъ; въ основаніи щитка идетъ поперечный очень нѣжный кантикъ бѣлаго цвѣта, соединяющій два большихъ угловыхъ бѣлыхъ бугорка;

кромѣ того на срединѣ основанія щитка находится еще большее бѣлое пятно, отъ котораго иногда, вдоль срединной линіи щитка, идетъ бѣловатая полоска постепенно исчезающая. Голова, щитокъ и переднеспинка покрыты мелкимъ, частымъ пунктиромъ, точки котораго соединяются иногда въ неправильные, короткіе ряды, при посредствѣ поперечныхъ бороздокъ. На надкрыльяхъ пунктииръ нѣсколько грубѣе, чѣмъ на остальныхъ частяхъ тѣла; самыя надкрылья трехцвѣтныя, именно основная и конечная ихъ части зеленоватыя, широкое срединное поле красноватобурое, наружный же край и большое овальное пятно на срединѣ corium'a бѣлые; пятно это сливается съ бѣлымъ краемъ и покрыто красноватобурыми грубыми точками; по темному фону надкрыльевъ раскиданы голые, возвышенные, бѣлые бугорки. Connexivum также трехцвѣтный: передній и задній края сегментовъ — ярковеленые, боковые края яркооранжевые, а средина желтоватобѣлая. Спинка черная съ парными желтоватыми пятнами на послѣднихъ кольцахъ брюшка. Туловище снизу мраморное, блѣднозеленоватое; средина груди и двѣ полосы на брюшкѣ, такъ же какъ и вѣшній край его, — желтоватые. Ноги зеленоватые, бедра у основанія блѣдножелтоватыя, лапки буроватожелтые. Дл. ♀ 10 мм., ♂ 8 $\frac{1}{2}$ —9 мм.

22. *Strachia Putoni* n. sp. T. II, фиг. 3. Körper breit-oval, oben schwarzgrün metallisch, unten gelbweiss. Pronotum weissgelblich, mit sechs schwarzen Flecken, die Mittellinie und Schulterecke orange. Schild schwarz, die Spitze, Seitenrand und Mittellinie — weissgelblich. Halbdecken schwarzgrün, Randfeld mit weisser Randlinie, am Grunde weiss, im Innenwinkel des Corium ein orangegelber viereckiger Querfleck, vor der Mitte des Corium ein weissgelber Fleck. Membran braun mit fünf Rippen, schwach weiss gesäumt, Rücken schwarz, Connexivum weisslich, mit schwarzen runden Mittelflecken. Bauchseiten mit schwarzem Querstrich auf jeder Stigma; die Schienen an den Seiten mit

schwarzem Querstreif; ein Randfleck im Grundwinkel jeder Schiene — schwarz. Beine weissgelblich mit schwarzen Streifen. L. 6 — 7 mm.

Сверху черного цвета, съ блестящимъ, металлически зеленымъ отливомъ, снизу свѣтлого, желтоватобѣлого цвета. Усики черные; задняя часть головы и конецъ носа металлическаго зеленаго цвета, широкіе же скапловые отростки и иногда пятна на затылкѣ оранжевожелтаго цвета. Хоботокъ желтоватобѣлый, послѣдніе два сустава черного цвета, изъ нихъ вершина третьяго желтоватая, иногда второй суставъ у основанія бываетъ черноватый. Переднеспинка по длини равна головѣ и втрое короче своей ширины, бѣловатожелтаго цвета, съ тремя парами металлическихъ пятенъ, какъ у *S. Gebleri*, *S. pustulata* и др. Плечевые углы и поперечная полоска свѣтлооранжеваго цвета. Вообще переднеспинка покрыта весьма крупнымъ пунктиромъ, между точками котораго, видны болѣе мелкія точки; передній же и задній края сплошь мелкоточечные. Боковые края щитка, его кончикъ и узкая продольная полоска желтоватобѣлого цвета съ оранжевымъ оттенкомъ. Надкрылья черныя съ яркимъ металлическимъ отливомъ и по рисунку ближе всего напоминаютъ надкрылья *S. dominula* Harr., именно: основаніе наружнаго края бѣлаго цвета, далѣе во всю длину надкрыльевъ, до перепонки, идеть бѣлый канть, такъ что нижнія три четверти наружнаго поля — черного цвета. Съ внутренней стороны главнаго ребра, въ центрѣ надкрыльевъ, помѣщается овальное пятнышко, а во внутреннемъ ихъ углу — поперечная полоска желтоватооранжеваго цвета. Перепонка бурая, съ слабымъ зеленоватымъ оттенкомъ и узкою бѣлою оторочкою; ребра перепонки, числомъ пять, весьма ясно выражены. Брюшко сверху черное, наружный ободокъ его и соплекхивум бѣловатые, съ черными полукруглыми пятнами въ срединѣ каждаго сегмента брюшка. На среднегруди черное пятно по срединѣ; по бокамъ груди и брюшка, вдоль дыхальца, проходитъ оранжевая полоска, какъ у *S. picta*. Брюшко

снизу бѣловатое, дыхальца чернаго цвѣта; подъ каждымъ дыхальцемъ проходитъ еще черная поперечная бороздка; по краю брюшка, въ верхнемъ углу каждого сегмента помѣщается небольшое овальное пятнышко. По бокамъ брюшка, каждое кольцо его отдѣляется одно отъ другаго черной линіей. Ноги бѣловатожелтые, бедра съ наружной стороны и голени съ внутренней имѣютъ черныхъ полоски; на бедрахъ передней пары замѣтно два черныхъ полукольца. Лапки чернаго цвѣта. Дл. 6 — 7 мм.

Этотъ небольшой, но очень красивый видъ, хорошо отличается отъ всѣхъ прочихъ расположениемъ пятенъ на надкрыльяхъ, напоминающихъ *S. dominula* Harris, цвѣтомъ брюшка и особенно продольною полоскою по срединной линіи щитка, чего до сихъ поръ не замѣчалось у известныхъ уже видовъ *Strachia*.

23. *S. adusta* n. sp. Ganz schwarzgrün, oben metallisch. Rand des Kopfes, des Pronotum und des Corium kielförmig, gelb; Mittellinie des Pronotum hinten und Schildspitze orangegelb. Unterseite pechschwarz, schwach metallisch. Wangenplatten, Fühlerhöcker, Bruststücke, Bauchmitte und Rand — gelb. Fühler und Beine ganz schwarz, fein weissbehaart. Hinterschienbeine etwas gekrümmmt. L.  $5\frac{1}{2}$  mm.

Все насѣкомое чернаго цвѣта, съ сильнымъ металлически-зеленымъ отливомъ на поверхности. Узкіе, въ видѣ канта, окраины головы, переднеспинки и надкрыльевъ желтаго цвѣта; короткая, узкая полоска по срединѣ переднеспинки, въ задней ея половинѣ, основаніе главнаго ребра на надкрыльяхъ и конецъ щитка — желтаго цвѣта, иногда съ оранжевымъ оттенкомъ. Снизу тулowiще смоляно-чернаго цвѣта, на брюшкѣ съ слабымъ фиолетовымъ металлическимъ отливомъ. Скуловые пластины, бугорки на которыхъ помѣщаются усики, двѣ пары пятенъ снизу головы, всѣ окраины частей груди, широкая средняя полоса вдоль брюшка снизу и очень узкая окраина его — желтаго цвѣта. Перепонка однообразнаго темнобурого цвѣта

сь узкой бъловатой оторочкой. Хоботокъ буроватожелтый. Усики и ноги черныя, одѣтыы нѣжными бъловатыми волосками. Голени задней пары ногъ слегка искривленныя. Дл. 5 $\frac{1}{2}$  мм.

Видъ этотъ болѣе всего похожъ на *S. consobrina* Put., послѣдній однако гораздо крупнѣе, выпуклѣе и шире, блестящаго синяго цвѣта, туловище снизу однообразнаго зеленовато-синяго цвѣта и вся поверхность гораздо грубѣе пунктирована.

**Barbiger n. gen.** K rper l nglich-oval; oben wenig gew lbt. Stirnschwiele eingeschlossen, Wangenplatten hinten mit grossem blattartigem Lappen. F hlerwurzel k rzer als der Kopf, Glied 2 mehr als doppelt l nger als 1, Glied 3 k rzer als 2, Glied 4 und 5 die st rksten, einander gleichlang und einzeln fast so lang als 2. Schnabel schlankgliederig, an das Ende der Hinterbrust reichend, sein Wurzelglied kaum l nger als der Kopf. Pronotum vorn verengt, Seiten fast gerade. Mittelbrust mit einem Mittelkiel. Schild lang, ziemlich schmal, am Ende stumpf. Membran mit 7 — 8 Rippen. Bauch unten sehr gew lbt. Beine unbewehrt.

Туловище продолговато овальное, сверху слабо выпуклое. Конецъ носа закрытый сильно выдающимися, съ боковъ окруженными, скуловыми отростками. Глаза большіе, выпуклые. Скуловыя пластинки (*bucculae*) вытягиваются назадъ въ очень большую округленную лопасть, которая съб шивается надъ переднегрудью. Бугороевъ, на которомъ сидять усики, отъ переднаго края глазъ круто идетъ внизъ и затѣмъ заворачивается къ переду; на концѣ его находится довольно острый зубчикъ. Первый суставъ усиковъ толстый, очень короткій, такъ что не хватаетъ до конца головы; второй суставъ въ два или въ два съ половиною раза длинѣе первого, третій короче втораго на половину или на одну четвертую часть; четвертый и пятый суставы утолщенные, каждый изъ нихъ почти равенъ по длини второму. Хоботокъ умѣренной толщины и достигаетъ до конца груди; первый суставъ его едва длин-

нѣе головы, второй очень длинный, почти въ два раза длиннѣе первого, слегка сжатый съ боковъ, послѣдніе два сустава равной длины и оба вмѣстѣ короче втораго, послѣдній суставъ тонкій, шиловидный. Переднеспинка съ почти прямыми боковыми краями, къ переду съуженная; передній край ея глубоко вырѣзанъ, плечи округленныя. Щитокъ длинный, довольно узкій, на концѣ болѣе или менѣе округленный; конецъ его приходится на одной линіи съ тупымъ концомъ corium'a. Перепонка нѣсколько длиннѣе брюшка, съ 7 — 8 ребрами, часто развѣтвляющимися. Брюшко снизу очень выпуклое. Ноги невооруженные, лапки короткія, не очень сильные, первый суставъ ихъ массивнѣе прочихъ. Вдоль груди идетъ возвышенное ребро.

24. *B. furvus* n. sp. Schwarz, matt, fein, dicht punctirt. Pronotumseiten gerade. Pronotum und Schild mit gelber durchlaufender Mittellinie. Fühlerhöcker, Rand des Pronotum und des Corium am Grunde gelb, Kopf und Bruststücke grob punctirt, Brust zersstreut, weiss, schuppenartig behaart. Beine und Fühler schwarz, braungelb behaart. Membran schwarzbraun, schmal weiss gesäumt. L. 10 mm.

Черный, матовый. Боковые края переднеспинки, брюшка и надкрыльевъ у основания ихъ, продольная линія идущая по срединѣ переднеспинки и щитка и бугорокъ на которомъ помѣщаются усики — яркаго желтаго цвѣта, гладкія, т. е. не покрыты пунктиромъ. Передъ глазами, въ углахъ щитка и по сторонамъ продольной линіи переднеспинки слабо обозначенные буроватожелтые пятна. Перепонка темнобурая съ узкой бѣлой оторочкой. Все наскѣкомое сверху покрыто частымъ, но довольно изѣжнымъ пунктиромъ, кромѣ того щитокъ имѣеть еще поперечные морщинки. Голова и грудь грубо, неправильно пунктированы, причемъ точки часто сливаются. Въ углубленіяхъ точекъ на груди находятся короткіе бѣловатые волоски въ видѣ чешуекъ, отчего вся грудь кажется сброватой. Брюшко слабо блестящее, по бокамъ нѣжно пунктированное. Усики и

ноги, за исключениемъ бедръ, покрыты рыжими волосками, которые на концахъ голеней и на лапкахъ снизу образуютъ густыя щётки. Части груди прилегающія къ основанию ногъ, самыя основания ногъ, первый суставъ хоботка, основание втораго и концы втораго и третьяго суставовъ блѣдно желтовато-бурые. Хоботокъ покрытъ длинными, стоячими бѣловатыми волосками. Боковые края переднеспинки прямые. Щитокъ, постепенно съуживающійся къ заду, образуетъ острѣ съ тупымъ концомъ. Скуловыя пластины въ видѣ большой лопасти, спереди и снизу округленной, а сзади довольно прямо обрѣзанной; задній край ихъ отстоитъ отъ переднегруди на некоторое разстояніе. Дл. 10 мм.

25. *B. Saundersi* n. sp. Schwarz, glänzend, sehr grob unregelmässig punctirt. Schild grob runzelig. Pronotumseiten etwas geschweift. Brust dicht filzig behaart. Pronotum und Schild mit durchlaufendem Mittelkiel. Seiten des Pronotum, des Corium an der Grundhälfte und Bauchrand gelb. Stirnchwiele, ein Fleck im Nacken und Schnabelwurzel am Grunde bräunlichroth. Membran ganz schwarzbraun. L. 11 mm.

Черный, слабо блестящій, весьма грубо пунктированный; щитокъ сильно морщинистый. Голова и грудь покрыты очень большими неправильными точками, часто сливающимися. По бокамъ переднеспинки, около средины наружного края, находится по большому углубленію, весьма густо усыпанному точками. Вдоль переднеспинки щитка проходитъ выпуклое ребро часто прерываемое поперечными морщинками, только въ передней части переднеспинки оно гладкое, блестящее. Средина щитка съ глубокой впадиной, основная же часть довольно выпуклая. Брюшко все грубо пунктировано, лишь вдоль средины его идетъ гладкая, узкая полоска. Передній край переднегруди очень густо покрытъ бѣловатыми волосками, стелющимися въ видѣ войлока. Ноги и усики, какъ у *B. furvus*, покрыты свѣтлорыжеватыми волосками. Гладкая, боковая окраина переднеспинки, надкрыльевъ, до половины ихъ длины, и брюшка, а

также пятно на затылкѣ и короткая полоска въ передней части переднеспинки — желтаго цвѣта. Конецъ носа и основаніе хоботка иногда красноватобурые. Перепонка темнобурая, безъ оторочки. Боковой край переднеспинки нѣсколько согнутый на срединѣ. Скуловыя пластинки въ видѣ большихъ, свѣшивающихся внизъ лопастей, сзади округленныхъ и близко прилегающихъ къ переднегруди. Щитокъ тупой, языковидный, въ задней своей половинѣ съ параллельными боками. Дл. 11 мм. \*)

30. *Stenocephalus albomarginatus* n. sp. Dem *S. agilis* Scop. im Bau und Farbe sehr ähnlich. Rand des Pronotum und des Corium, Connexivum und Bauchrand unten breit weiss. Membran gleichfarbig, hellbräunlich. Füsse bräunlich. L. 12 mm.

Очень похожъ на *S. agilis* Scop. и *S. neglectus* H. S., отличается одинакоже нѣсколькими рѣзкими признаками, изъ которыхъ наиболѣе характерный — это широкая белая полоса, которая идетъ по боковымъ краямъ переднеспинки и надкрыльевъ; широкій connexivum, сверху и снизу, также совершенно белый, безъ черныхъ пятенъ. Бедра передней пары ногъ не черные, какъ у тѣхъ видовъ, а такого же цвѣта, какъ и у остальныхъ паръ, т. е. свѣтлые, грязноватобелые у основанія и чернѣющія къ вершинѣ; лапки не черные, но буроватыя. Усики совершенно такие же какъ у *S. agilis* Scop.; перепонка же полупрозрачная, свѣтлобуроватая, съ ребрами такого же цвѣта и безъ пятенъ въ промежуткахъ между ребрами. Дл. 12 мм.

36. *Peritrechus flavicornis* n. sp. Körper schwarz; Fühler,

\*) Къ этому же роду относится *B. Herrichi*, описанный и изображенный Коленати въ его *Meletemata Entomologica* (Fasc. IV. p. 33, Tab. XV, fig. 33) подъ именемъ *Ialla Herrichii*. Подъ послѣднимъ названіемъ видъ этотъ значится и у Фибера (Die Europ. Hemiptera, 1861, p. 346) и въ каталогѣ Ютона изданія 1875 г. Роды *Ialla* и *Barbiger* не имѣютъ между собою ничего общаго; они даже относятся къ разнымъ группамъ: первый къ Тр. *Asopini*, а второй къ Тр. *Pentatomini*. Видъ Коленати очень близокъ къ *B. furvus* m., но отличается отъ послѣдняго, съ первого взгляда, сильнымъ пунктиромъ и черными, болѣе округленными краями переднеспинки.

Schnabel und Beine schmutziggelb; Fühlerwurzel bräunlich, Ende gelb, Glied 4 ganz bräunlich, Kopf fein punctirt, silberweiss-filzig. Halbdecken sehr fein punctirt, bleich graugelblich, weiss gefleckt und gestreift. Connexivum schwarz. L.  $4\frac{1}{2}$  mm.

Туловище черного цвета; усики, хоботокъ и ноги грязно-желтаго цвета; первый суставъ усиковъ, за исключениемъ вершины, и послѣдній — буроватые; также какъ и когти. Голова мелко пунктированная, полублестящая, густо покрытая серебристо бѣлыми волосками; конецъ носа красноватобурый. Переднеспинка трапециoidalной формы, въ переду значительно суженная и довольно короткая, такъ что длина ея гораздо меньше ширины между плечами. Боковые края ея, передъ плечевыми углами, нѣсколько вогнуты. Ребра идущія по бокамъ переднеспинки слабыя, килеватыя, впереди черного цвета, а передъ плечевыми возвышеніями свѣтло желтага. Узкій передній край переднеспинки буроватый, задній — грязно-желтаго цвета, покрытый мелкимъ чернымъ пунктиромъ; на плечевыхъ возвышеніяхъ бурое пятно; вдоль задней половины переднеспинки замѣтны три темныхъ полоски. Щитокъ узкій, конецъ его какъ у другихъ видовъ. Надкрылья блѣдно желтоватосѣрыя, съ большими бѣлыми полупрозрачными пятнами. На clavus двѣ длинныхъ бѣлыхъ полоски — одна у основанія, другая передъ концомъ; во внутреннемъ углу согiум'a большое треугольное бѣлое пятно; боковой край надкрыльевъ блѣдоватый, гладкій, съ двумя буроватыми пятнышками: однимъ на срединѣ, другимъ — въ самомъ углу согiум'a. Пунктиръ на надкрыльяхъ очень нѣжный; грубѣе всего пунктированъ щитокъ. Какъ переднеспинка, такъ и надкрылья покрыты очень нѣжными сѣроватыми волосками. Перепонка свѣтлая, полупрозрачная, съ нѣсколькими бурыми пятнами на концѣ. Брюшко, также какъ и connexivum совершенно черные; по краямъ брюшка нѣсколько длинныхъ рыхихъ щетинокъ. Туловище вообще узкое и боковые края надкрыльевъ почти прямые. Дл.  $4\frac{1}{2}$  мм.

38. *Pachymerus luridus* n. sp. Körper, Schild, Schenkel und Fühler schwarz; Fühlerglied 1 oben, Glied 2 und 3 an der Grundhälfte bräunlich. Die Seiten und Hinterhälfte des Pronotum bräunlichgelb, Schulterecke schwarz. Halbdecken bräunlich-gelb mit schwarzem rautenförmigen Fleck im Innenwinkel des Corium. Membran milchweiss, fein bräunlich umschattet, ohne Flecke. Bauch und Connexivum ganz schwarz. Schenkel oben gelblich; Schienbeine und Füsse braun. Pronotumseitenrand schmal, geschweift. L. 5 mm.

Туловище, щитокъ, усики и бедра чернаго цвѣта; первый суставъ усиковъ на концѣ буроватый, равно какъ основная половина втораго и третьаго. Переднеспинка съ узкими боковыми краями, на срединѣ замѣтно вогнутыми; передний и боковые края, равно какъ задняя половина переднеспинки буроватожелтаго цвѣта; плечевые углы — черные. Надкрылья однообразнаго буроватожелтаго цвѣта, съ большимъ ромбоидальнымъ пятномъ чернаго цвѣта во внутреннемъ углу corium'a. Перепонка полупрозрачная, молочнобѣллаго цвѣта, съ буроватымъ оттенкомъ, безъ пятенъ. Connexivum, какъ и все брюшко, чернаго цвѣта. Вершина бедръ и основаніе голеней желтоватыя, самыя же голени и лапки бураго цвѣта. Дл. 5 mm.

Видъ этотъ, принадлежащий къ Фиберовскому роду *Beosus*, который нынѣ слить въ одинъ родъ — *Pachymerus*, хорошо отличается формою своей переднеспинки, съ узкими выгнутыми листоватыми краями, также отсутствиемъ мембранального пятна и другими признаками; такъ, отъ *P. saturnius* и *P. quadratus*, онъ разнится болѣе темными усиками и чернымъ connexivum; *P. Douglassi*, напротивъ, имѣеть всѣ конечности чернаго цвѣта.

39. *Monanthia ovatula* n. sp. Körper kurz-oval. Oberseite schmutzig gelbweiss, fein staubbehaart und zerstreut langborstig bewimpert. Fühler und Beine röthlichgelb, lang behaart. Fühlerendglied und Klauen schwarz. Abdomen schwarzbraun. Halsblase hinten halbrund, vorn abgestutzt. Pronotumseiten

schmal, blattartig, nur mit einer Reihe kleiner Maschen. Die Rippen und Pronotumkiele schwarz kleinfleckig. Ein Fleck in der Randmitte der Decken und die Randpunkte schwarz. Mittelfeld bisweilen bräunlich. L.  $2\frac{1}{2}$  mm.

Относится къ подроду *Platychila* Fieb. Переднеспинка, грудь и надкрылья — грязного желтоватобѣлого цвѣта; вся поверхность покрыта рѣдкими, но сильными стоячими щетинками; кромѣ того нѣкоторыя части, особенно голова и грудь, покрыты, въ видѣ пыли, мельчайшими бѣловатыми волосками. Усики и ноги рыжеватые, длинноволосистые, послѣдній суставъ усиковъ и когти на ногахъ чернаго цвѣта. Шейный пузырь полукруглой формы, спереди прямо обрѣзанъ. Боковые края переднеспинки узкие, листоватые, въ одинъ рядъ клѣточекъ, нѣсколько приподнятые къ верху и почти прямые, съ широко-округленными плечевыми углами; реберъ переднеспинки три, довольно высокихъ, параллельныхъ, среднее изъ нихъ проходитъ и по шейному пузырю, боковые впереди нѣсколько загнуты внутрь. Надкрылья овальной формы, съ узкой перепонкой; крайнее поле широкое, изъ двухъ рядовъ крупныхъ клѣточекъ. На ребрахъ переднеспинки и надкрыльевъ, а также по краямъ ихъ, находится нѣсколько черныхъ точекъ; на срединѣ крайняго поля надкрыльевъ черное пятно, образованное изъ черныхъ реберъ и ихъ анастомозовъ, центры же клѣточекъ, ограниченные этими ребрами, остаются свѣтлыми. Внутреннее поле надкрыльевъ иногда буроватое. Брюшко темнобурое. Дл.  $2\frac{1}{2}$  мм., ширина брюшка  $1\frac{1}{2}$  мм.

43. *Orthops pilosulus* n. sp. Ganz orangeroth, fein weisslich behaart und dicht punctirt. Kopf glatt, glänzend, Querleiste im Nicken stark, weiss. Schnabelwurzel röthlich, Endglied braun. Fühler orangegelb, Glied 3 und 4 fein bräunlich. Schild weiss, am Grunde orangeroth. Clavus, Cuneus in der Mitte und eine breite Binde am Ende des Corium orangeroth. Membran hell, durchsichtig, irisirend. Beine gelblich, Hinterschenkelende

roth, Schienbeindornen gelb. Klauenglied am Ende, Klauen und Mittelbrust schwarz. L. 4 mm.

Преобладающий цвет всего наружного оранжевокрасный; туловище сверху и снизу покрыто весьма нежными светлыми волосками. Переднеспинка, щиток и надкрылья, особенно послѣднія, покрыты частымъ и глубокимъ пунктиромъ, только на cuneus точки нѣжнѣе. Перепонка светлая, прозрачная, сильно опализирующая.

Голова гладкая, блестящая, красноватооранжеваго цвета; при этомъ можно замѣтить, что красный пигментъ располагается болѣе или менѣе правильными поперечными полосками въ два ряда, идущими вдоль всей поверхности головы; затылочный кантъ между глазами сильный, почти бѣлаго цвета. Глаза крупные, темновишневаго, почти чернаго цвета. Хоботокъ оранжевый, первый суставъ у основания красноватый, послѣдній на концѣ бурый. Усики однообразнаго желтовато-оранжеваго цвета, послѣдніе два сустава съ буроватымъ оттенкомъ; переднеспинка оранжеваго цвета, края ея, особенно же передній — красноватые; передній кантъ бѣлаго цвета. Щитокъ бѣлый, съ большими основнымъ треугольнымъ пятномъ оранжевокраснаго цвета; весь clavus, кроме конца, широкая поперечная полоса въ задней половинѣ ихъ, а также средина cuneus оранжевокраснаго цвета. Брюшко сверху и снизу и конецъ бедръ задней пары ногъ — такого же цвета, но болѣе слабаго оттенка. Среднегрудь чернаго цвета. Ноги желтоватыя, равно какъ и шипики покрывающіе голени. Конецъ когтеваго сустава и самые когти — чернаго цвета. Дл. около 4 мм. (♂).

46. *Halticus consimilis* n. sp. Ganz schwarz, oben dicht goldgelb behaart. Pronotum und Schild sehr fein runzelig, Halbdecken stärker punctirt. Fühler, Schenkelende, Schienbeine und Füsse gelblich. Fühlerwurzel am Grunde, Glied 2 oben, Glied 3 und 4 ganz dunkelbraun. Schienbeinende und Klauen-glied bräunlich. Kopf schmal, convex. L.  $2\frac{1}{2}$  mm. (♂).

Весь черного цвета; туловище снизу и голова очень блестящая, переднеспинка и надкрылья более матовый, покрытый довольно густо золотистожелтыми прилегающими волосками. Голова узкая, выпуклая, съ рѣдкими волосками. Переднеспинка и щитокъ покрыты весьма нѣжными поперечными струйками, надкрылья пунктированы нѣсколько сильнѣе. Перепонка и клѣтки ея одноцвѣтныя, темнобурыя. Усики, вершина бедръ, голени и лапки блѣдножелтоватые; основаніе первого сустава усиковъ, верхняя третья втораго, третій и четвертый суставы сплошна темнобураго цвета, также какъ концы голеней и послѣдній суставъ лапокъ. Дл.  $2\frac{1}{2}$  мм.

Очень похожъ на *H. apterus*, *H. pusillus* H.S. и *H. puncticollis* Fieb., но хорошо отличается формою головы, цветомъ усииковъ, нѣжнымъ пунктиромъ и золотистыми волосками.

49. *Tetraphleps pilosus* n. sp. Schwarz, glänzend, dicht graubehaart und lang bewimpert. Fühler ganz schwarz, dick, Wurzelglied kürzer als der Vorderkopf. Pronotum und Schild dicht querrunzelig. Halbdecken weissgelblich, Clavus am Grunde und innen, ein Fleck am Clavusende, Cuneus und Coriumenddrittel — schwarzbraun. Coriumende neben dem Innenwinkel mit runden, lichten Flecken. Membran fast durchsichtig, weisslich, am Ende rauchbraun, Rippen (4) weisslich, braun umschattet. Unterseite ganz schwarz. Schenkel schwarz, Schenkelende, Schienbeine und Füsse gelbröthlich, Schienbeingrund und Ende bräunlich. Fühler und Beine lang behaart. L.  $3\frac{1}{2}$  — 4 mm.

Черный, довольно блестящий, густо покрытый длинными, сѣроватыми волосками; на головѣ, переднеспинкѣ и щите раскидано кромѣ того много, очень длинныхъ, стоячихъ щетинокъ. Усики довольно массивные, совершенно черного цвета, первый суставъ ихъ не достигаетъ конца головы. Переднеспинка и щитокъ покрыты довольно сильными поперечными струйками, которые на переднеспинкѣ расположены очень густо. Надкрылья светло желтоватыя, основаніе clavus, внутренний край его, прилегающій къ щите, и общее овальное пятно

на концѣ его — темнобурыя, также какъ синеи и задняя часть corium'а; два крупныхъ пятна во внутреннемъ углу corium'а свѣтлыя. Перепонка полупрозрачная, свѣтлая въ основной половинѣ, съ четырьмя свѣтлыми же ребрами, оттѣненными по бокамъ буроватыми полосками; конецъ перепонки дымчатобурый. Нижняя сторона вся черного цвѣта. Бедра черные, вершины ихъ, голени и иногда лапки краснорыжія; основаніе голеней и концы ихъ, а также лапки — буроватыя. Когти рыжія. Усики и ноги, особенно голени съ вѣшней стороны, покрыты длинными волосками. Дл.  $3\frac{1}{2}$  — 4 мм.

Видъ этотъ хорошо отличается отъ *T. vittatus* Fieb. своей волосистостью, чернымъ блестящимъ цвѣтомъ туловища, болѣе массивными одноцвѣтными усииками и нѣсколько укороченной головой.

53. *Harpactor persicus* n. sp. T. II фиг. 4. Unterseite, Kopf, Vordertheil des Pronotum, Schild, Rücken und Fühler schwarz. Fühlerglied 3 und 4 schmutzigbraun. Kopf schmal, verlängert, Stirnchwiele und ein Querstrich zwischen den Ocellen — rothgelb. Hintertheil des Pronotum, Corium und Beine roth, Schildspitze gelb, Clavus hell, durchsichtig. Knie und Schienbeinende schwarz; Füse schmutzigbraun. L. 14 mm.

Снизу весь черный, также какъ голова, хоботокъ, передняя доля переднеспинки и щитокъ. Все туловище и ноги покрыты бѣловатыми волосками. Усики черные, послѣдніе два сустава гранячно-бурые. Конецъ носа и поперечное пятнышко на затылкѣ, между простыми глазками, красновато-желтаго цвѣта. Голова вообще узкая, вытянутая. Передняя доля переднеспинки въ полтора раза короче задней; по бокамъ задней доли идутъ двѣ черные полоски, отъ передней доли до плечеваго возвышенія. Задняя доля переднеспинки, corium, ноги и генитальный суставъ брюшка ярко-краснаго, иногда оранжево-краснаго цвѣта. Щитокъ черный, широкій, съ желтоватымъ ободкомъ на тупомъ концѣ. Clavus и прилегающая къ нему часть corium стекловидная, прозрачная; sutura clavi — красный. Брюшко

сверху черное; connexivum красновато-желтый, съ черными пятнами въ основныхъ углахъ брюшныхъ сегментовъ. Ноги красные; ляшки, вертлуги, основание бедръ, голени и концы голеней — черные. Лапки грязно-бурые, когти темнѣе. Дл. 14 мм.

54. *H. pumilus* n. sp. Ganz schwarz, dicht hellbraunlich behaart. Schildspitze und ein Querstrich zwischen den Ocellen gelblich. Corium braunlichgelb, filzig hell behaart. Connexivum braunlich-gelb, mit dunkelbraunen Grundflecken. Membran braunlich, grün, metallisch schimmernd. Fühler und Füsse hell schmutzigbraunlich, Fühlerglied 1 am Grunde und Glied 2 ganz dunkelbraun. Schnabelwurzel viel kürzer als Glied 2. L. 9 mm.

Весь черный, довольно густо покрытый небольшими светлобуроватыми или почти бледоватыми волосками; на нижней сторонѣ брюшка волоски эти раскиданы очень рѣдко. На затылкѣ, между простыми глазами, находится поперечное желтоватое пятнышко. Усики и лапки светлые, грязноватобурые, только основаніе первого сустава усиковъ и весь второй темнобурые. Второй суставъ хоботка гораздо длиннѣе первого. Передняя доля переднеспинки немного короче задней. Щитокъ черный, съ грязно-желтымъ кантомъ на тупомъ концѣ. Corium грязно буровато-желтый, покрытый въ видѣ пуха светлыми волосками, clavus прозрачный, стекловидный. Перепонка буроватая, съ зеленымъ металлическимъ отливомъ и темнобурыми ребрами. Connexivum широкий, грязно буроватый съ болѣе темными, буроватыми полосками въ основныхъ углахъ брюшныхъ сегментовъ. Дл. 9 мм.

56. *H. Christophi* n. sp. Ganz schwarz, matt, filzig behaart, Füsse braunroth, Connexivum schwarz, mit schmutzigweissem, schmalem Grund auf den Schnittstücken. Fühlerglied 3 und 4 braunlich. Kopf schmal, sehr verlängert. Hinterschienbeine spinbelförmig. L. 14 — 15 mm.

Совершенно черный, матовый, покрытый короткими бледоватыми волосками въ видѣ пуха, особенно голова и грудь.

Лапки буроватокрасные, послѣдній суставъ ихъ темный, когти красноватые съ однимъ сильнымъ зубцомъ у основанія. Соплекшивъ съ грязнобѣлыми поперечными полосками на заднемъ краю брюшныхъ сегментовъ. Послѣдніе два сустава усиковъ буроватые. Голова сильно вытянута, такъ что равняется длиной переднеспинки. На затылкѣ между простыми глазами находится небольшое свѣтлое пятнышко. Голени задней пары ногъ прямые, веретенообразные, сильно суженные передъ концомъ, они мало по малу разширяются къ верху, а передъ самымъ основаніемъ снова суживаются. Этотъ послѣдній признакъ, вмѣстѣ съ цветомъ туловища и формою головы, составляютъ самыя существенные отличія отъ остальныхъ видовъ этого рода. Дл. 14 — 15 мм.

Астрахань.

4 Ноября 1876.