

день былъ мною только одинъ экземпляръ; въ 1878 же году попадались перѣдко.

Gen. *Campylomma* Reut.

11. *C. viridula* n. sp.

Oberseite bleich bläulichgrün, glänzend, fast durchsichtig, fein braun behaart. Unterseite grün. Die Fühler sind bei den Männchen weniger stark als bei den Weibchen; ♂—Fühler schwarz, Glied 2 stabförmig; Glied 1 und 2 oben und 3—4 ganz weisslich; ♀—Fühler dünn, bleichgelblich, Wurzelglied grün, unterseits mit schwarzem Fleck; Glied 2 am Grunde schwarz. Membran bleichbräunlich, Zellrippen bläulichgrün. Beine grünlich weiss, Schenkel dicht schwarz gefleckt, Schienbeine aus schwarzen Punkten schwarzbedornt. Brustmitte schwarz. L. $2\frac{3}{4}$ mm. — Astrachan. Sa-repta.

Снизу яркозеленаго цвѣта, сверху однообразно блѣдный, голубоватозеленый, блестящій, съ полупрозрачными надкрыльями, густо покрытый весьма нѣжными буроватыми волосками. Усики образованы и окрашены различно у самца и самки, но второй суставъ ихъ всегда на четверть короче ширины переднеспинки; у ♂ второй суставъ усиковъ массивный, одинаковой толщины по всей своей длинѣ, весь чернаго цвѣта, равно какъ и первый суставъ; вершины ихъ и оба послѣдніе сустава бѣловатые; у ♀ усики тонкіе, первый суставъ ихъ яркозеленаго цвѣта, съ чернымъ пятномъ на внутренней сторонѣ сустава и черной щетинкой, второй